

Halamid®



Desinfektion til fjerkræ



I professionel fjerkræproduktion med mange fjerkræ øges risikoen for sygdomme. Stalde, udstyr og lastbiler som ikke er rengjorte, og desinficerede ordentligt er årsagen til overførsel af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Den fremragende effektivitet af Halamid imod bakterier og virusser hos fjerkræ er testet og godkendt af flere laboratorier, og ved forsøg i marken.

Halamid dækker alle områder i fjerkræproduktionen, hvor du har brug for at desinficere (Stalde, udstyr, køretøjer og fodbade.) Halamid bruges ved at sprøjte eller forstøve og for at fjerne biofilm.

Halamid et unikt produkt

- Bredt aktivitets spektrum
- Ingen tæring af materialer
- Let og alsidig i brug
- Let bio nedbrydeligt
- Ingen risiko for udvikling af resistente mikroorganismer

Effektivitet

Halamid er effektiv imod de fleste bakterier og virusser, der er relaterede til produktion af fjerkræ. Her nævnes nogle få, men listen er lang:

Bakterier

- Enterbakterier
- E-coli
- Listeria
- Pseudomonas sp
- Salmonella sp
- Staphylococcus Aureus
- Streptococcus Faecalis

Virusser

- Aviær Influenza
- Aviær Reo Syge
- Celo Virus
- Newcastle Syge
- Gumboro Syge
- Bronkitis Infektion
- Bursitis Infektion
- Falsk Fugle Pest

Anbefalet koncentration

Område	Koncentration	Bemærkninger
Overflade desinfektion i stalde ved forstøvning	2-3%	40-50ml/m ³
Desinfektion af køretøjer	1%	
Støvlebad	2%	Fornydes ca. 2 gange/uge
Desinfektion af vandsystem	0,5%	Rens efterfølgende med rent vand
Til kontinuerligt drikkevandsdesinfektion	Til 100 liter doseringsvand tilsættes 1 kg	Doseringspumpe med doseringsvand indstilles til 2% blanding
Æg desinfektion	0,3%	Se anvendelse på næste side.

m ²	x	Stald højde	x	Faktor V	=	Vandforbrug i liter
m ²	x	Stald højde	x	Faktor H	=	Halamidforbrug i kg
	x		x	0,045	=	
	x		x	0,00135	=	

Sprededstyr til Halamid

Motorblæser:

Til både våd- og tørdesinfektion



Hygiejnemåtter

60x90 cm og 180x90 cm
 Anvendes hvor støvle-
 desinfektion er nødvendig.
 Måtten fyldes med vand
 tilsat Halamid.
 Vandet skiftes mindst 2
 gange pr uge og efter behov.



Generelle desinfektions regler

Husk altid inden du desinficerer, at rengøre grundigt, for at sikre det bedste resultat. Rengøres der ikke ordentligt, mindsker skidt og organiske stoffer desinfektionens virkning. Start at skrabe ud og fjerne gødning m.m. Rengør med vand eller sæbeopløsning. Herefter desinficeres med anvist Halamidopløsning.

Overflade og stald desinfektion

Ved tomme stalde, rengør grundigt og desinficer med Halamid opløsningen, der påføres ved at spraye eller forstøve. Halamid fjerner biofilm.

Ved sprayning dækkes hele overflade området. (inklusive vægge og loft)

Vandrensningsventil og fjernelse af biofilm

Når stalden er udstyret med en vandrensningsventil, desinficeres stalden med Halamid opløsningen ved hjælp af fjernelse af biofilm igennem vandrensningsventilen. Dette er bevist ikke bare at være effektivt, men også nemt at tilføre, samt økonomisk i brug.

Støvlebad

Et støvlebad skal placeres ved indgangen i hver bygning og alle skal bruge det. Badet fornyes efter behov, dog mindst 2 gange om ugen.

Desinfektion af lastbiler

Transporten med lastbiler fra gård til gård er en stor risiko for overførslen af sygdomme. Derfor er det vigtigt at sikre sig at køretøjerne er ordentlig desinficeret (inklusive hjulene) før ankomst til gården. Halamid er specielt godt at bruge da det ikke tærer på materialer og da produktet er aktivt selv ved lave temperaturer.

Vandsystem desinfektion

Rent drikkevand er en vigtigt parameter for dyrenes velvære.

Når stalde er tomme føres en opløsning på 0,5% Halamid igennem vandsystemerne i 30 min. Herefter der skylles med rent vand.

Æg desinfektion

Udrugnings æg desinficeres med Halamid: Rengør, skyld, desinficer og tør. For at forhindre at æggeskallen absorberer Halamid opløsningen, skal temperaturen for hvert trin skal være et par grader højere end det foregående trin: Vask æggene med en vaskemiddelopløsning på 30°C, rens med rent vand på 35°C og dyp så ægget i 3 min. i en Halamid opløsning på 0,3% på 40°C. Herefter tørres æggene.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DESINFEKTION AF FORBRUGSÆG IKKE ER TILLADT

