

Halamid®



Gård og veterinær desinfektion



Den effektive brug af Halamid® mod skadelige bakterier og vira er bekræftet af talrige laboratorie- og feltforsøg for alle dyregrupper.

Biosikkerhedsforanstaltninger er relevant for alle i hele "jord til bord" kæden og starter med en effektiv desinfektion i stalden. Halamid® er et desinfektionsmiddel, som kan bruges på alle de områder, der behøver at blive desinficeret som f.eks. stalde, udstyr, køretøjer og klovbade.

Du bruger bl.a. Halamid ved at sprøjte og forstøve.

Ved al desinfektion, uanset om det er i bedriften eller klinikken, bruges Halamid®.

I malkekvægbesætninger bruges Halamid ved desinfektion af yver samt malkeudstyr.

I fjerkræavl bruges Halamid blandt andet ved desinfektion af rugeæg.

I svinestalden tilsættes Halamid til vådfoderanlæg og drikkevand.

I minkavl anvendes Halamid til desinfektion af tråd bure.

Til heste bruges Halamid til desinfektion af muk, sur stråle og ringorm med en opløsning på 2%.

Vedr. andre dyregrupper: Forhør dig hos din Staldren-konsulent.



Anbefalet koncentration

| Anvendelsesformer | Koncentration | Bemærkninger |
|---|--|--|
| Overflade og stald desinfektion ved forstøvning | 2%-3% | 40-50 ml/m ³ |
| Desinfektion af køretøj | 1% | |
| Desinfektion af vandsystem | 0,5% | Rens med rent vand |
| Desinfektion af æg | 0,3% | |
| Til kontinuerlig drikkevandsdesinfektion | 200 gr. + 20 liter vand, doseringspumpen stilles til 2 % | Doseringspumpen stilles til en 2% blanding |
| Til støvlebad ved indgang | 2% | Forny så ofte det er nødvendigt |
| Kopatte desinfektion | 0,3% | |
| Desinfektion af malkningsudstyr | 0,3%-0,5% | Rens med rent vand |
| Klovbad | 1 % | Udskiftes efter behov |
| Til kontinuerlig brug ved vådfodringsanlæg | Iblandes 0,02% = 20 gr. Pr. 1000 kg | Fjerner skimmel, svampe og alle former for bakterier |

| Beregn Halamidforbrug til desinfektion i stalde | | | |
|---|-------------|-----------|----------------------|
| m ² | Stald højde | Faktor V | Vandforbrug i liter |
| x | x | 0,045 = | |
| m ² | Stald højde | Faktor H | Forbrug Halamid i kg |
| x | x | 0,00135 = | |

Generelle desinfektions regler

Husk altid inden du desinficerer, at rengøre grundigt, for at sikre det bedste resultat. Rengøres der ikke ordentligt, mindsker skidt og organiske stoffer desinfektionens virkning.

Start at skrabe ud og fjerne gødning m.m. Rengør med vand eller sæbeopløsning. Herefter desinficeres med anvist Halamidopløsning.

Overflade og stald desinfektion

Ved tomme stalde, rengør grundigt og desinficer med Halamid opløsningen, der påføres ved at spraye eller forstøve. Halamid fjerner biofilm.

Ved sprayning dækkes hele overflade området. (inklusive vægge og loft)

Vandrensningsventil og fjernelse af biofilm

Når stalden er udstyret med en vandrensningsventil, desinficeres stalden med Halamid opløsningen ved hjælp af fjernelse af biofilm igennem vandrensningsventilen. Dette er bevist ikke bare at være effektivt, men også nemt at tilføre, samt økonomisk i brug.

Støvlebad

Et støvlebad skal placeres ved indgangen i hver bygning og staldafsnit, og alle skal bruge det. Badet fornyes efter behov, dog mindst 2 gange om ugen.

Desinfektion af lastbiler

Transporten med lastbiler fra gård til gård er en stor risiko for overførslen af sygdomme. Derfor er det vigtigt at sikre sig at køretøjerne er ordentlig desinficeret (inklusive hjulene) før ankomst til gården. Halamid er specielt godt at bruge da det ikke tærer på materialer og da produktet er aktivt selv ved lave temperaturer.

Vandsystem desinfektion

Rent drikkevand er en vigtig parameter for dyrenes velvære.

Når stalde er tomme føres en opløsning på 0,5% Halamid igennem vandsystemerne i 30 min. Herefter der skylles med rent vand.

Spredeudstyr til Halamid

Motorblæser:

Til både våd- og tørdesinfektion



Hygiejnemåtter

60x90 cm og 180x90 cm
Anvendes hvor støvle-
desinfektion er nødvendig.
Måtten fyldes med vand
tilsat Halamid.

Vandet skiftes mindst 2
gange pr uge og efter behov.

