

JORENKU Staldren®



Farestien: Før faring spredes Staldren® i hele stien. Brug en god nævefuld(50-100g) pr. m². Efter faring bruges Staldren® 3 dage i træk. Der efter 2 gange om ugen indtil fravæning. Koncentrer Staldren® bag ved soen, omkring krybben, i smågrisehulen samt andre fugtige steder i stien. Det er her bakterierne trives.

Fravænningsstien: Brug Staldren® 3 dage i træk, derefter 2 gange om ugen. Sørg for at ramme hvilearealet samt de fugtige steder i stien.

Slagtesvinestien: Brug Staldren® 1-2 gange om ugen. Det giver et bedre miljø og har en klar dæmpende virkning på smittetrykket.

Drægtighedsstalde: Spred Staldren® i hele stien. Brug en god håndfuld (50-100g) pr. m².

Udleveringsrum: Anvend Staldren® på hele gulvarealet både før og efter udlevering/modtagelse for at mindske risikoen for smitte.

Tomme stalde: Spred Staldren® ud med blæser, da komponenterne i Staldren® har en god effekt på vira. Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et velduftende staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

- Mindsker diarré
- Bedre vækst, bedre indtagelse af mælk
- Mindsker dødelighed
- Holder bakterieniveauet på et lavt niveau
- Skaber generelt et bedre helbred i svineproduktionen
- Skaber et bedre miljø for både dyr og mennesker
- Forbygger yverbetændelse



