

Staldren®



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren®



Το Staldren® είναι ένα φάρμακο υγιεινής σε μορφή σκόνης το οποίο δρα αποτελεσματικά ενάντια στην υγρασία, τη μυρωδιά, τα βακτηρίδια και τα σπόρια των μυκήτων.

- Το Staldren® είναι ένα προϊόν Δανίας, το οποίο έχει ελεγχθεί πλήρως από αναγνωρισ-μένα διεθνή εργαστήρια για χρήση ως προϊόν υγιεινής και χρησιμοποιείται παγκοσμίως.
- Το Staldren® είναι φιλικό προς το περιβάλλον, και το σημαντικότερο, έχει μια καλά τεκμηριωμένη επίδραση στα πιο κοινά βακτηρίδια και σπόρια μυκήτων. (Παρακαλώ δείτε συμπληρωματικά έγγραφα στην 7 σελίδα).
- Το Staldren® είναι απαλλαγμένο από φωσφορικά και με ουδέτερο PH, με την έννοια ότι δεν διαλύει ή και να αλλοιώσει δάπεδα ή άλλες επιφάνειες και δεν στεγνώνει στο λεπτό δέρμα ενός ζώου, το οποίο μπορεί να έχει τάση για γδαρσίματα που μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε βακτηριακή μόλυνση και ασθένεια . Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να χρησιμοποιείτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε το Staldren®.
- Το Staldren® δεσμεύει την αμμωνία σε τέτοιο βαθμό ώστε, τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την έντονη μυρωδιά και αναπνευστικές δυσκολίες.
- Το Staldren® απορροφά την υγρασία, και είναι επομένως ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρους με υψηλή υγρασία.
- Το Staldren® απολυμαίνει και καθαρίζει το περιβάλλον αγροικίας, μειώνει το επίπεδο της μόλυνσης και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει την υγιεινή των ζώων.
- Το Staldren® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα κατοικίδια ζώα, και αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα για τους επαγγελματίες και τους κτηνοτρόφους.

Όταν χρησιμοποιείτε Staldren® συνεχώς, θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, μειώνοντας το επίπεδο της μόλυνσης ,αλλά και θα έχετε μια ευχάριστη οσμή στο χοιροστάσιο, προς όφελος τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων.

Το Staldren® παρέχει μια ελάχιστη σκόνη και είναι πολύ εύκολο να εξαπλωθεί, καθώς δίνει μια ευχάριστη μυρωδιά στο κοτέτσι.

Το Staldren® συσκευάζεται σε σάκους των 10, 15 ή των 25 kg, καθώς και σε παλέτες με 10, 20, 40, 45, 50 ή σάκους 66.

JORENKU Staldren®



Staldren® Για βοοειδή και μοσχάρια

Το Staldren® σε βοοειδή χρησιμοποιείται όπως παρακάτω:

Απλώστε μια καλή χούφτα (50-100g) ανά τ.μ. 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό θα λειτουργήσει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στη μείωση της μόλυνσης. Σε περιπτώσεις μεγάλης υγρασίας ή στην αρχή κάποιας αρρώστιας η ποσότητα και η συχνότητα χρήσης πρέπει να αυξάνεται κάθε μέρα.

Στους στάβλους, το Staldren® απλώνεται στο πίσω μέρος τη θέσης του ζώου, όπου η υγρασία προκαλεί μια πιθανή αύξηση ορισμένων βακτηριδίων, και οι μύκητες μπορούν γρήγορα να πολλαπλασιάζονται σε μεγάλους αριθμούς, και μπορεί, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν φλεγμονή του μαστού και διάφορα άλλα προβλήματα στις σπλές.

Όταν το ζώο βρίσκεται στο κουτί του, το Staldren®, χρησιμοποιείται όπως προαναφέρθηκε, αλλά και στα μεγάλα κουτιά, όπου οι αγελάδες μπορεί να γυρίσουν, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες ποσότητες του προϊόντος. (Πρέπει να σκορπιστεί σε ολόκληρο το κουτί).

Σε αχυρένια κρεβάτια / πάγκους ή κρεβάτια / κουτιά, χρησιμοποιείται: το Staldren® μία φορά την εβδομάδα με μια καλή χούφτα (50-100g) ανά τ.μ.

Στο χώρο / κουτί του τοκετού, εξαπλώστε το Staldren® σε όλη την επιφάνεια, έτσι ώστε όλο το κουτί να απολυμανθεί. Σκορπίστε το πρώτα σε ένα καθαρό κρεβάτι και στο τέλος προσθέστε Staldren® και πάλι για να καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ κάθε τοκετού, έτσι ώστε το μοσχαράκι να γεννηθεί σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο καθαρό. Αυτό θα εμποδίσει τη δυνατότητα των μολυσματικών ασθενειών, τόσο με στην αγελάδα όσο και το μοσχάρι. Στο κουτί του μικρού μοσχαριού χρησιμοποιείτε το Staldren® 2 φορές την εβδομάδα με μια καλή χούφτα (50-100g) ανά μ². Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει κάθε γωνιά και άκρη του κουτιού, όπου μαζεύονται οι μύγες. Σε περίπτωση διάρροιας χρησιμοποιείτε το Staldren® κάθε μέρα, μέχρι να επανέλθει το ζώο.



JORENKU Staldren®



Staldren® Για χοίρους

Staldren® κατά τη χρήση σε χοίρους συνιστώνται τα εξής:

Στο μέρος τοκετού: Πριν από τον τοκετό το Staldren® διασκορπίζεται σε όλο το χοιροστάσιο. Χρησιμοποιήστε μία γεμάτη χούφτα (50-100g) / μ^2 . Μετά τον τοκετό χρησιμοποιήστε το Staldren® 3 ημέρες στη σειρά. Στη συνέχεια το χρησιμοποιήσετε 2 φορές την εβδομάδα μέχρι τον απογαλακτισμό. Επικεντρώστε τη χρήση του Staldren® πίσω από τη χοιρομητέρα, γύρω από το παχνί, και στη γωνιά των χοιριδίων, καθώς και άλλες υγρές περιοχές στο εσωτερικό του χοιροστασίου, εκεί όπου ευδοκιμούν τα βακτηρίδια.

Στη σφαγή: χρησιμοποιήστε το Staldren® 3 ημέρες στη σειρά, και έπειτα 2 φορές την εβδομάδα. Να είστε βέβαιοι ότι καλύπτεται καλά ο χώρος ανάπαυσης, καθώς και τις υγρές περιοχές στο χοιροστάσιο.

Στο σφαγείο των χοίρων ρίξτε το Staldren® μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό παρέχει ένα καλύτερο περιβάλλον και θα έχει σημαντική επίδραση μειώνοντας το επίπεδο της μόλυνσης.

Στα άρρωστα ζώα χρησιμοποιήστε το Staldren® καθημερινά καλύπτοντας όλο το έδαφος.

Στους χοίρους σε οίστρο και τις έγκυες σκορπίστε το Staldren® σε όλο το χοιροστάσιο. Χρησιμοποιήστε μια γεμάτη χούφτα (50-100g) / τ.μ.

Στον χώρο αποστολής / άφιξης των ζώων σκορπίστε το Staldren® έτσι ώστε να καλύπτει όλο το έδαφος, τόσο πριν όσο και μετά την αποστολή / άφιξη των ζώων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

Σε άδειο στάβλο: το Staldren® μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη ευκολότερα λόγω της εξάπλωσής του με μια μονάδα ανεμιστήρα. Σημειώτέ, ότι τα συστατικά του Staldren® έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση διάφορων ιών.



JORENKU Staldren®



Staldren® Για πουλερικά

Το Staldren® για κλώσες χρησιμοποιείται ως ακολούθως:

καταβολάδα: Το Staldren® χρησιμοποιείται στη φωλιά πριν να γεννηθούν τα κοτοπουλάκια. Απλώστε μια μικρή ποσότητα σε κάθε φωλιά, περίπου 1 γεμάτη χούφτα (50-100g). Απλώστε το Staldren® (100g / m²), όπου αυτό αντιστοιχεί σε 1 x 25kg σάκους για κάθε 250 m² κάλυψης εδάφους. Χρησιμοποιήστε το Staldren® μία φορά την εβδομάδα στις φωλιές καθώς και για το σύνολο του εδάφους, ώστε οι συνθήκες να διατηρούνται πάντα στο υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι τα βακτηρίδια ελέγχονται, η αμμωνία δεσμεύεται και η υγρασία που απορροφάται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός από την ταΐστρα.



Το Staldren® στο ορνιθοσφαγείο: Σε ένα άδειο (1500τ.μ) και καθαρό ορνιθοτροφείο, απλώστε 75 kg Staldren® (50g / m²) με έναν ανεμιστήρα ή μια σπάτουλα. Όταν η περιοχή καλυφθεί πλήρως με τα στρώματα, τότε απλώνεται 50 κιλά Staldren® πάνω από αυτά. Μέχρι να πάνε οι όρνιθες για σφαγή, πρέπει μια φορά την εβδομάδα να απλώνουμε 50 κιλά Staldren®. Σε ένα πολύ υγρό περιβάλλον ή σε περίπτωση εμφάνισης βακτηριδίων, η χρησιμοποιούμενη ποσότητα του Staldren® πρέπει να αυξηθεί. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ανεμιστήρας για την διασκόρπιση του Staldren®, τότε θα έχει πολύ καλή επίδραση κατά της vira. Το Staldren® είναι με ουδέτερο pH, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και για τα πόδια και το αυγό της κότας.

JORENKU Staldren®



Staldren® Για άλογα

Το Staldren® για τα άλογα χρησιμοποιείται ως κατωτέρω:

Το Staldren®, με την επίδρασή του στην υγρασία και τους μύκητες, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιπτώσεων βακτηριακής μόλυνσης οπλών αλλά και των πορωδών οπλών.

Η βακτηριακή μόλυνση αντιμετωπίζεται με Staldren® ακριβώς κάτω από τις οπλές.

Μετά τον καθαρισμό του στάβλου το Staldren® διασκορπίζεται σε όλο το εμβαδόν του δαπέδου με περίπου 1-3 πλήρης χούφτες (50-100g) ανά τ.μ., έτσι ώστε η επιφάνεια του πατώματος να στεγνώνει και η οσμή αμμωνίας να ελαχιστοποιείται. Με την τοποθέτηση του στρώματος στο κουτί του αλόγου, απλώνουμε το Staldren® κατά μήκος των άκρων, έτσι ώστε να ξεραθούν τα αυγά και οι προνύμφες των εντόμων. Το Staldren® χρησιμοποιείται, στη συνέχεια, σε υγρές περιοχές, όπου τα στρώματα αλλάζουν 2-3 φορές την εβδομάδα. Διασκορπίζουμε το Staldren® και απλώνεται κατά μήκος της άκρης του κουτιού, προκειμένου να ξεραθούν τα αυγά και οι προνύμφες των εντόμων.

Στα καθαρά κουτιά των πουλαριών το Staldren® διασκορπίζεται σε όλο το πάτωμα, έτσι ώστε να απολυμανθεί το κουτί, και μετά στρώνονται τα καθαρά στρώματα. Μετά, το Staldren® απλώνεται σε όλη την περιοχή, έτσι ώστε τα νέα πουλάρια να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καθαρότερο περιβάλλον. Αυτό αποτρέπει την εξάπλωση λοιμωδών νόσων τόσο για τη φοράδα όσο και το πουλάρι.



JORENKU Staldren®



Staldren® Για πρόβατα και αίγες

Staldren® Για πρόβατα και αίγες. Χρησιμοποιείται ως εξής:

Στον χώρο των νεογνών: Ο χώρος των νεογνών καθαρίζεται σχολαστικά, και το Staldren® απλώνεται σε όλο τον όροφο με 1 - 2 καλές χούφτες (50-100g) ανά τ.μ., έτσι ώστε το σύνολο της επιφάνειας να καλύπτεται με Staldren®. Στη συνέχεια, το πάτωμα καλύπτεται με άχυρα, και απλώνεται πάλι το Staldren® με 1-2 χούφτες (50-100g) ανά τ.μ. Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη απλώνεται και στις γωνίες και στις άκρες, έτσι ώστε να εξουδετερώνονται τα αυγά και οι προνύμφες από των εντόμων. Το Staldren® απλώνεται ανάμεσα στις ράγες, έτσι ώστε το νεογέννητο αρνάκι / κατσικάκι να παίρνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή.

Σε πάγκους με βαθιά στρωμνή: απλώστε το Staldren® με μια καλή χούφτα (50-100g) ανά τ.μ. σε ολόκληρο το πάτωμα πριν απλώσετε τα άχυρα. Το Staldren® θα πρέπει να απλώνεται πάνω από κάθε κάλυψη. Με τη συνεχή χρήση του Staldren® θα επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, διότι μειώνεται συνεχώς η εμφάνιση νόσων και, ως εκ τούτου, θα έχετε μια ευχάριστη οσμή στο περιβάλλον του στάβλου, προς όφελος τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων.



Παράρτημα 9 - Πιστοποιητικό ανάλυσης nr. DKE 016078-06 and 0074-06

Μέθοδος:

Διαλύουμε 4g Staldren® σε 5 ml φυσικού διαλύματος Χλωριούχου Νατρίου (Natrium Chloride). Ψεκάζουμε με 1 ml βακτηρίδια ή μύκητες το διάλυμα με το Staldren® αλλά και ένα φυσικό διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 9ml.

Τα διαλύματα φυλάσσονται σε αερόβιες/αναερόβιες/συνθήκες φιλτραρισμένου αέρα αναλόγως των ατμοσφαιρικών αναγκών των μικροοργανισμών. Ο πληθυσμός των βακτηρίων προσμετράται μετά από 1 ώρα και μετά από 2 ημέρες.

Αποτελέσματα	Staldren®		Χωρίς Staldren®	
	1 ώρα	2 μέρες	1 ώρα	2 μέρες
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



EL/Staldren/BRO/0424

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk