
Staldren®



JORENKU Staldren®



Staldren® гигиеническое средство в виде порошка ржаво-розового цвета, обладающее многоцелевым действием против влаги, запаха, бактерий, спор плесневых грибов, личинок мух и паразитов.

- Staldren® датский продукт, который прошел полное тестирование во всемирно признанной лаборатории, обладающей правом на проверку и аттестацию аналогичных препаратов.
- Staldren® абсолютно безопасен для окружающей среды, животных и людей. Обладает документированно подтвержденным эффектом борьбы против наиболее распространенных видов бактерий и спор плесневых грибов (см. документацию на стр. 7).
- Staldren® не содержит фосфатов, имеет нейтральный уровень Ph, что означает, что этот препарат не разъедает половое покрытие и инвентарь и, что еще важнее, не осушает кожу животных, что может вызвать трещины, которые позволяют бактериям проникать в организм животного и вызывать инфекции и болезни. При работе с препаратом Staldren® не требуется специальных защитных средств.
- Staldren® снижает уровень и нейтрализует запах аммиака и сероводородов, таким образом, что и животные, и люди могут находиться в помещении, не ощущая неприятных запахов.
- Staldren® активно поглощает сырость и влагу, и поэтому особенно эффективен при применении в помещениях с высокой влажностью.
- Staldren® способствует эффективному очищению окружающей животных среды, уменьшает риск возникновения инфекций и снижает уровень заболеваний, обеспечивая таким образом здоровое поголовье.
- Staldren® применяется для всех видов сельскохозяйственных животных и является незаменимым средством для профессионального животноводства.

Постоянное использование порошка Staldren® обеспечит Вам благоприятную, сухую окружающую среду, надлежащие санитарные условия, отлично защитит от запаха и уничтожит насекомых и паразитов – на благо как животным, так и людям.

Staldren® является малопыльным, легко рассыпается и дает приятный запах в помещении.

Staldren® поставляется в 10, 15 и 25-килограммовых мешках, а также на поддонах по 10, 20, 40, 45, 50 или 66 мешков.

JORENKU Staldren®



Staldren® для Крупного Рогатого Скота

Для крупного рогатого скота Staldren® применяется следующим образом:

Рассыпайте примерно 50-100 грамм порошка на один кв. м. (одна хорошая пригоршня) два раза в неделю. В течение короткого времени это существенно снизит риск возникновения инфекций. В случае особо сырых условий или появления болезней нужно увеличить объем порошка и частоту его применения.

В коровнике с привязным содержанием: Рассыпайте порошок Staldren® в задней части стойла, где, из-за сырости, имеется риск наиболее активного размножения бактерий и грибов, и особенно под коровой, где находится вымя во время отдыха животного. Это способствует резкому снижению риска заболевания маститами и повышению качества молока за счет снижения бактериальной обсемененности.

В коровнике с беспривязным содержанием: Применяйте Staldren® в местах отдыха животных как указано выше, рассыпая порошок Staldren® по всему стойлу, так как коровы при беспривязном содержании могут разворачиваться в стойле.

В коровнике с глубокой подстилкой: Применяйте порошок Staldren® 1 раза в неделю в зависимости от общего состояния загона, используя 50-100 грамм порошка на один кв. м.

В стойле/боксе для отёла: После очистки стойла/бокса, обработайте всю площадь пола порошком Staldren®. Затем уложите чистую свежую подстилку и добавьте порошок Staldren® еще раз по всей площади. Эта обработка производится между каждым отелом с тем, чтобы дать возможность телятам родиться в как можно более чистой среде и предотвратить возникновение инфекционных заболеваний как у коров, так и у телят. В стойле/боксе для телят. Применяйте порошок Staldren® 2 раза в неделю, используя 50-100 грамм порошка на один кв. м. Важно, чтобы углы и стыки пола со стенами были покрыты порошком. Именно в этих местах обычно откладываются личинки мух и скапливаются бактерии.

В случае вспышки диареи применяйте порошок Staldren® ежедневно до момента окончания вспышки.



JORENKU Staldren®



Staldren® в свиноводстве

Для свиней Staldren® применяется следующим образом:

В загоне для опороса: Перед опоросом обработайте порошком Staldren® всю площадь пола загона, используя примерно 50-100 грамм порошка на один кв. м. (одна хорошая пригоршня). После опороса применяйте порошок Staldren® ежедневно, по одному разу в день, в течение 3-х дней, а затем два раза в неделю до отъема. Особое внимание при применении порошка Staldren® уделяйте местам, где имеется риск наиболее активного размножения бактерий, а именно: под свиноматкой, и особенно позади свиноматки, вокруг кормушки, в месте отдыха поросят и в других сырых местах загона.

В загоне для поросят-отъемышей: применяйте порошок Staldren® ежедневно, по одному разу в день, в течение 3-х дней, а затем два раза в неделю до перевода поросят в другое помещение. Особое внимание уделяйте обработке мест одыха поросят и сырых мест загона.

В загоне для откорма свиней: Применяйте порошок Staldren® 1-2 раза в неделю в зависимости от общего состояния загона. Постоянное применение порошка Staldren® улучшает общее санитарное состояние окружающей среды в загоне и существенно снижает риск возникновения инфекций.

В загоне для больных животных: Применяйте порошок Staldren® ежедневно, рассыпая по всей площади пола примерно 50-100 грамм порошка на один кв. м.

В загонах для хряков, для свиноматок в периоде течки или супоросости: Обрабатывайте порошком Staldren® всю площадь загонов 1-2 раза в неделю в зависимости от общего состояния загона, используя 50-100 грамм порошка на один кв. м.

В помещении выдачи / приемки животных: Обрабатывайте порошком Staldren® всю площадь пола до и после выдачи/приемки с тем, чтобы снизить риск инфекции.

В пустых свинарниках: Рекомендуется производить полную обработку всего помещения порошком Staldren® с помощью распылителя. Это способствует эффективной борьбе с бактериями, вирусами, грибами, личинками мух и паразитами.



JORENKU Staldren®



Staldren® в птицеводстве

Для домашней птицы Staldren® применяется следующим образом:

Для кур-несушек: Применяйте порошок Staldren® в гнездах перед посадкой новых кур в курятник. Насыпьте слой порошка Staldren® в каждое гнездо (примерно 50-100 грамм – пригоршня). Рассыпьте Staldren® по всей площади пола курятника (примерно 100 грамм на один кв. м., что равно одному 25-ти килограммовому мешку на 250 кв. м.). Применяйте порошок Staldren® 1 раз в неделю в гнездах и на всей площади пола курятника с тем, чтобы постоянно поддерживать хорошую экологическую среду и санитарное состояние помещения. Staldren® эффективно связывает аммиак, что в высокой степени предотвращает ожоги подушек ног кур и оберегает фаллопиевы трубы курицы от аммиачных ожогов.



Для бройлеров: Перед посадкой птиц в чистое помещение распределите порошок Staldren® по всей площади пола из расчета 50 грамм на один кв. м. Затем уложите подстилочный материал и сверху распределите порошок Staldren® в таком же количестве, как указано выше. В дальнейшем, в течении всего периода выращивания бройлеров, применяйте Staldren® 1 раза в неделю, в зависимости от состояния пола и помещения. В случае сырой среды или проблем с бактериями/паразитами, рекомендуется увеличить объем используемого порошка. Рекомендуется также применять Staldren® для полной дезинфекции помещения с помощью распылителя для снижения риска инфекции. В этом случае порошок Staldren® рекомендуется применять в пустом помещении. Staldren® имеет нейтральный уровень Ph и поэтому бережно относится к окружающей среде, оберегает ноги и фаллопиевы трубы курицы от аммиачных ожогов.

JORENKU Staldren®



Staldren® для лошадей

Для лошадей Staldren® применяется следующим образом:

Порошок Staldren® является идеальным средством для профилактики болезни копыт лошадей. За счет эффекта высыхания и убивания спор плесневых грибов порошок Staldren® способствует уменьшению случаев пористых копыт и гниения стрелки копыта. При наличии гниения стрелки копыта произведите хорошую расчистку поражённого участка, сделайте тёплую ванночку с лечебным раствором. На обсохшую стрелку засыпьте порошок Staldren®. Обрабатывайте порошком Staldren® поверхность под копытом до полного излечения и далее на регулярной основе как профилактику заболевания.



После удаления навоза рассыпьте порошок Staldren® по всей площади пола денника из расчета примерно 50-100 грамм на один кв. м. для обеспечения сухой поверхности пола и снижения до минимума запах аммиака. Особое внимание уделяйте стыкам стен с полом и потолком и углам, где собирается влага и соответственно размножаются бактерии и откладываются личинки и яйца мухами и другими насекомыми и паразитами. применяйте порошок Staldren® 2-3 раза в неделю, рассыпая на подстилку, а также при замене подстилки. Особое внимание уделяйте сырым местам, где порошок Staldren® добавляйте по мере необходимости. Это будет способствовать поддержанию эффекта высыхания яиц и личинок мух и других насекомых и паразитов.

При подготовке бокса для жеребения рассыпьте порошок Staldren® по всей площади пола, что будет способствовать его полной дезинфекции. Особое внимание уделяйте стыкам стен с полом, потолком и углам, где собирается влага. Затем уложите чистую свежую подстилку, и добавьте еще раз порошок Staldren® по всей площади с тем, чтобы дать возможность жеребенку родиться в как можно более чистой среде и предотвратить возникновение инфекционных заболеваний как у кобылы, так и у жеребенка.

JORENKU Staldren®



Staldren® для овец и коз

Для овец и коз Staldren® применяется следующим образом:

В стойле для ягнения: После очистки стойла, распределите порошок Staldren® по всей площади пола. Используйте примерно 50-100 гр. порошка (1-2 хорошие горсти) на один кв. м. с тем, чтобы вся площадь была покрыта порошком Staldren®. Затем уложите солому, и добавьте еще раз порошок Staldren® в таком же количестве. Важно, чтобы вся площадь помещения и особенно углы и стыки пола со стенами были покрыты порошком. Используйте порошок Staldren® между каждым ягнением с тем, чтобы дать новорожденным ягнятам/козлятам, как можно лучшее начало жизни.

В хлевах с глубокой подстилкой: Рассыпьте порошок Staldren® по всей площади пола до подачи соломы, также как указано выше. Каждый слой соломы посыпайте порошком Staldren®, используя 1-2 горсти на кв. м. Постоянное использование порошка Staldren® обеспечит Вам благоприятную, сухую окружающую среду, надлежащие санитарные условия, отлично защитит от запаха и уничтожит насекомых и паразитов – на благо как животным, так и людям.



Тест № DKE 016078-06 и 0074-06

Результаты испытаний препарата Staldren®, проведенных датской сертифицированной лабораторией на предмет его эффективности в борьбе с наиболее опасными видами бактерий

Метод:

4 грамма Staldren® растворяются в 5 мл. физиологического раствора хлорида натрия. В растворы с добавлением Staldren® и контрольный раствор без добавления Staldren® (9 мл. физиологического раствора) вводится по 1 мл. суспензии с бактериями или грибами. Смеси находились в аэробном/анаэробном/микроаэрофильном режиме в зависимости от атмосферных требований. Растворы содержались при комнатной температуре. Количество бактерий определено через 1 час и 2 дня.

Результаты	С применением Staldren®		Контроль без Staldren®	
	1 час	2 дня	1 час	2 дня
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



RU/Staldren/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk