


Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green ir pulverveida higiēnisks produkts, kas plaši iedarbojas pret mitrumu, smakām, baktērijām un sēnīšu sporām.

- Staldren® Green var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā.
- Staldren® Green ir Dānijā ražots produkts, kas pārbaudīts starptautiski atzītās laboratorijās.
- Staldren® Green ir pierādīta nekaitīga ietekme uz apkārtējo vidi un dokumentēta ietekme biežāk sastopamo baktēriju un sēnīšu sporu izplatīšanās novēršanā (skatīt dokumentāciju 7 lpp).
- Staldren® Green ir bez fosfātiem, kā arī pH neitrāls, tādējādi nebojājot grīdas un kūts aprīkojumu, un vēl svarīgāk – tas nesaicina dzīvnieku maigo ādu, kā rezultātā novērš ādas plaisu rašanos, kurās varētu vairoties baktērijas un radīt dažādas infekcijas un slimības. Arī cimdu lietošana nav nepieciešama.
- Staldren® Green uzsūc amonjaku, tādējādi cilvēkiem un dzīvniekiem nodrošinot atvieglotu pārvietošanos pa telpām, nejūtot smaku un elpošanas grūtības.
- Staldren® Green absorbē mitrumu un drēgnumu, tādējādi tas ir ļoti piemērots telpās ar augstu gaisa mitruma līmeni.
- Staldren® Green dezinficē un attīra kūts vidi, samazina lipīgo slimību izplatību, tādējādi nodrošinot veselu ganāmpulku.
- Staldren® Green var lietot visās dzīvnieku fermās un tas ir nepieciešams jebkurā profesionālā lopkopības jomā.

Līdz ar nepārtrauktu Staldren® Green lietošanu iespējams sasniegt vislabākos rezultātus, jo infekciju izplatība tiek visu laiku samazināta, tādējādi iegūstot patīkami smaržojošu vidi novietnēs, kas ir labvēlīga gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem.

Staldren® Green ir minimāli putekļi, tas ir viegli izkaisāms un nodrošina svaigu un patīkamu smaržu kūtīs.

Staldren® Green var iegādāties 10 kg, 15 kg vai 25 kg maisos, vai uz paletēm ar 10, 20, 40 vai 66 maisos.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green liellopiem un grūsnām govīm

Staldren® Green lietošana liellopu un grūсну govju kopībā ir šāda:

Divas reizes nedēļā izkaisiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta uz kvadrātmtru. Tas spēcīgi iedarbosies, īsā laikā samazinot infekciju risku. Īpaši mitros apstākļos vai slimību laikā produkts jālieto biežāk (katru dienu) un koncentrētā veidā.



Aizgaldos: Piesietās turēšanas aizgaldos Staldren® Green jāizkaisa aiz silēm, kur mitrums pieļauj dažādu baktēriju un sēnīšu vairošanos lielos daudzumos, tādējādi pieļaujot mastīta un dažādu nagu slimību izplatību.

Naktsguļas aizgaldos Staldren® Green jālieto tāpat kā aprakstīts iepriekš, bet lielākos aplokos, kur govīs var brīvi apgriezties, iespējams ir nepieciešams to lietot koncentrētā veidā (jāapstrādā visa grīda).

Aizgaldos ar biezākiem pakaišiem nepieciešams izkaisīt kārtīgu sauju (50-100g) Staldren® Green uz kvadrātmtru vienu reizi nedēļā.

Iztīrītā atnešanās novietnē Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu, lai dezinficētu aizgaldus. Pēc tam jāizkaisa svaigi un tīri pakaiši, beigās atkal pārkaisot visu virsmu ar Staldren® Green. Tas jādara starp atnešanās reizēm, lai nodrošinātu teļu atnešanos iespējami tīrākā vidē. Šāda rīcība novērš infekciju izplatību gan govīm, gan teļiem. Pārliecinieties, ka tiek apkaisīti arī aizgaldu stūri, kuros parasti vairojas mušas. Diarejas infekcijas gadījumā Staldren® Green jālieto katru dienu, līdz slimības uzliesmojuma beigām.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green cūkām

Staldren® Green lietošana sivēnkopībā ir šāda:

Atnešanās novietnes: Pirms atnešanās Staldren® Green jāizkaisa pa visām ejām. Nemiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta uz kvadrātmtru. Pēc atnešanās lietojiet Staldren® Green trīs dienas pēc kārtas. Pēc tam lietojiet divas reizes nedēļā līdz atšķiršanai. Koncentrētu devu Staldren® Green izkaisiet aiz sivēnmātēm, ap silēm un sivēnu novietnēs un citās mitrās vietās. Tajās visbiežāk vairojas baktērijas.



Atradināšanas novietnēs nepieciešams lietot Staldren® Green trīs dienas pēc kārtas, pēc tam divas reizes nedēļā. Pārliecinieties, ka tiek izkaisītas atpūtas zonas un citas mitrās vietas.

Kautuvēs Staldren® Green nepieciešams lietot 1 -2 reizes nedēļā. Tas nodrošinās labāku vidi un novērsīs infekciju izplatīšanos.

Slimo dzīvnieku aizgaldos Staldren® Green jākaisa katru dienu pa visu grīdu.

Kuiļu novietnēs, aplokos un cūku atnešanās aizgaldos Staldren® Green jāizkaisa pa visām ejām. Nemiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta uz kvadrātmtru.

Atnešanās telpā/pieņemšanas novietnē Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu pirms un pēc atnešanās, lai samazinātu infekciju rašanās iespējamību.

Tukšās novietnēs iespējams izkliegt Staldren® Green ar ventilatora palīdzību, tādējādi ļaujot Staldren® Green sastāvdaļām iznīdēt vīrusus.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green mājpūtniem

Staldren® Green lietošana putnkopībā ir šāda:

Dējējvīsta: Staldren® Green tiek lietots gatavos būros, kuros tiks ievietoti jaunie cāļi. Plānā slānī izkaisiet apmēram vienu sauju (50-100g) produkta pa būri. Izkaisiet Staldren® Green pa visu grīdu (apm. 100g uz kvadrātmētru), kas atbilst vienam 25kg maisam uz 250 kvadrātmētriem grīdas virsmas. Centieties lietot Staldren® Green 1 reizi nedēļā perēšanas būros, kā arī pa visu grīdu, lai vienmēr nodrošinātu augstas kvalitātes apstākļus.

Tādējādi tiks ierobežota baktēriju izplatība, amonjaks tiks nomākts un mitrums uzsūks, un kāju un nagu slimību izplatība samazināta.

Kautuvēs: Uz 1500 kvadrātmētru platību jāizkaisa 75 kg Staldren® Green (50 g. uz kvadrātmētru) ar ventilatora vai izklieģētāja palīdzību. Pēc tam telpa jāizkaisa ar pakaišiem, kam pa virsu jāizkaisa 50 kg Staldren® Green. Pēc tam ievietojiet cāļus un visu telpu atkārtoti izkaisiet ar 50 kg Staldren® Green katru nedēļu līdz kaušanai. Mitrākā vidē, kā arī pie paaugstinātas baktēriju izplatības, Staldren® Green koncentrācijas līmenis ir jāpaaugstina. Arī tukšo vistu novietņu regulāra izsmidzināšana ar Staldren® Green labvēlīgi ietekmē vidi. Staldren® Green ir PH neitrāls, kas nozīmē nekaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī uz vistu kājām un nagiem.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green zirgiem

Staldren® Green lietošana zirgkopībā ir šāda:

Ragvielas puves gadījumā Staldren® Green tiek izbārstīts tieši zirgiem zem kājām.

Kad stallis piemēslots, Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu, apmēram 1-3 sauļas (50-100g) uz kvadrātmetru, lai grīda izžūtu un samazinātos amonjaka smaka. Steliņgi jāizkaisa ar pakaišiem un to stūri ar Staldren® Green, lai mušu oliņas un kāpuri izžūst. Mitrās vietās un pēc pakaišu nomaiņas Staldren® Green jālieto šādi: 2-3 reizes nedēļā Staldren® Green jāizkaisa gar steliņa stūriem, lai nodrošinātu mušu oliņu un kāpuru izžūšanu.

Iztīrītos steliņgos Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdu, lai to dezinficētu, un pēc tam jāizklāj svaigi pakaiši. Beigās atkārtoti izkaisiet Staldren® Green pa visu grīdu, lai nodrošinātu pēc iespējas tīrāku vidi kumeljiem. Tas nodrošinās infekcijas slimību ierobežošanu gan ķēvēm, gan arī kumeljiem.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green aitām un kazām

Staldren® Green lietošana aitu un kazu kopībā ir šāda:

Jēru aizgaldos: jēru aizgaldos Staldren® Green tiek izkaisīts apmēram 1-2 saujas (50-100g) uz kvadrātmetru pa visu grīdu tā, lai visa virsma tiktu noklāta. Pēc tam jāizkaisa pakaiši un atkal 1-2 saujas (50-100g) Staldren® Green uz kvadrātmetru, pārliedzinoties, ka visi stūri iz izkaisīti, lai novērstu mušu olniņu un kāpuru vairošanos. Staldren® Green jāizkaisa katras atnešanās laikā, lai jēriem nodrošinātu vislabāko dzīves sākumu.

Aizgaldos ar bieziem pakaišiem: Staldren® Green jāizkaisa pa visu grīdas virsmu apmēram viena kārtīga sauja (50-100g) uz kvadrātmetru. Staldren® Green tiek izkaisīts katrā kārtā. Staldren® Green ir pulverveida higiēnisks produkts, kas plaši iedarbojas pret mitrumu, smakām, baktērijām un sēnīšu sporām.



JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75
94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

9. pielikums analīžu sertifikātam Test. nr. DKE 016078-06 un 0074-06

Metode:

4 g Staldren® Green tika iejaukti 5 ml fizioloģiskā nātrija hlorīda šķīdumā. Staldren® Green šķīdumā un kontroles šķīdumā bez Staldren® Green (9 ml fizioloģiskais NaCl šķīdums) katrā tika inokulēts 1ml baktēriju vai sēņu suspensija. Šie maisījumi tikai turēti aerobos, anaerobos, mikroaerofilos apstākļos (atkarībā no baktēriju vai sēņu īpatnībām) istabas temperatūrā. Baktēriju daudzums tika mērīts pēc vienas stundas un divām diennaktīm.

Result	Staldren® Green		Kontrole bez Staldren® Green	
	1 stunda	2 dienas	1 stunda	2 dienas
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



LV/Staldren Green/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk