


Staldren®



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren®



Staldren® ir pulverveida higiēnisks produkts, kas plaši iedarbojas pret mitrumu, smakām, baktērijām un sēnīšu sporām.

- Staldren® ir Dānijā ražots produkts, kas pārbaudīts starptautiski atzītās laboratorijās.
- Staldren® ir pierādīta nekaitīga ietekme uz apkārtējo vidi un dokumentēta ietekme biežāk sastopamo baktēriju un sēnīšu sporu izplatīšanās novēršanā (skatīt dokumentāciju 7 lpp).
- Staldren® ir bez fosfātiem, kā arī pH neitrāls, tādējādi nebojājot grīdas un kūts aprīkojumu, un vēl svarīgāk – tas nesaicina dzīvnieku maigo ādu, kā rezultātā novērš ādas plaisu rašanos, kurās varētu vairoties baktērijas un radīt dažādas infekcijas un slimības. Arī cimdu lietošana nav nepieciešama.
- Staldren® uzsūc amonjaku, tādējādi cilvēkiem un dzīvniekiem nodrošinot atvieglotu pārvietošanos pa telpām, nejūtot smaku un elpošanas grūtības.
- Staldren® absorbē mitrumu un drēgnumu, tādējādi tas ir ļoti piemērots telpās ar augstu gaisa mitruma līmeni.
- Staldren® dezinficē un attīra kūts vidi, samazina lipīgo slimību izplatību, tādējādi nodrošinot veselu ganāmpulku.
- Staldren® var lietot visās dzīvnieku fermās un tas ir nepieciešams jebkurā profesionālā lopkopības jomā.

Līdz ar nepārtrauktu Staldren® lietošanu iespējams sasniegt vislabākos rezultātus, jo infekciju izplatība tiek visu laiku samazināta, tādējādi iegūstot patīkami smaržojošu vidi novietnēs, kas ir labvēlīga gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem.

Staldren® ir minimāli putekļi, tas ir viegli izkaisāms un nodrošina svaigu un patīkamu smaržu kūtīs.

Staldren® var iegādāties 10 kg, 15 kg vai 25 kg maisos, vai uz paletēm ar 10, 20, 40, 45, 50 vai 66 maisos.

JORENKU Staldren®



Staldren® liellopiem un grūsnām govīm

Staldren® lietošana liellopu un grūsnu govju kopībā ir šāda:

Divas reizes nedēļā izkaisiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta uz kvadrātmtru. Tas spēcīgi iedarbosies, īsā laikā samazinot infekciju risku. Īpaši mitros apstākļos vai slimību laikā produkts jālieto biežāk (katru dienu) un koncentrētā veidā.

Aizgaldos: Piesietās turēšanas aizgaldos Staldren® jāizkaisa aiz silēm, kur mitrums pieļauj dažādu baktēriju un sēnīšu vairošanos lielos daudzumos, tādējādi pieļaujot mastīta un dažādu nagu slimību izplatību.

Naktsguļas aizgaldos Staldren® jālieto tāpat kā aprakstīts iepriekš, bet lielākos aplokos, kur govis var brīvi apgriezties, iespējams ir nepieciešams to lietot koncentrētā veidā (jāapstrādā visa grīda).

Aizgaldos ar biezākiem pakaišiem nepieciešams izkaisīt kārtīgu sauju (50-100g) Staldren® uz kvadrātmtru vienu reizi nedēļā.

Iztīrītā atnešanās novietnē Staldren® jāizkaisa pa visu grīdu, lai dezinficētu aizgaldus. Pēc tam jāizkaisa svaigi un tīri pakaiši, beigās atkal pārkaisot visu virsmu ar Staldren®. Tas jādara starp atnešanās reizēm, lai nodrošinātu teļu atnešanos iespējami tīrākā vidē. Šāda rīcība novērš infekciju izplatību gan govīm, gan teļiem. Pārļiecinieties, ka tiek apkaisīti arī aizgaldu stūri, kuros parasti vairojas mušas. Diarejas infekcijas gadījumā Staldren® jālieto katru dienu, līdz slimības uzliesmojuma beigām.



JORENKU Staldren®



Staldren® cūkām

Staldren® lietošana sivēnkopībā ir šāda:

Atnešanās novietnes: Pirms atnešanās Staldren® jāizkaisa pa visām ejām. Ņemiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta uz kvadrātmetru. Pēc atnešanās lietojiet Staldren® trīs dienas pēc kārtas. Pēc tam lietojiet divas reizes nedēļā līdz atšķiršanai. Koncentrētu devu Staldren® izkaisiet aiz sivēnmātēm, ap silēm un sivēnu novietnēs un citās mitrās vietās. Tajās visbiežāk vairojas baktērijas.



Atradināšanas novietnēs nepieciešams lietot Staldren® trīs dienas pēc kārtas, pēc tam divas reizes nedēļā. Pārliecinieties, ka tiek izkaisītas atpūtas zonas un citas mitrās vietas.

Kautuvēs Staldren® nepieciešams lietot 1 -2 reizes nedēļā. Tas nodrošinās labāku vidi un novērsīs infekciju izplatīšanos.

Slimo dzīvnieku aizgaldos Staldren® jākaisa katru dienu pa visu grīdu.

Kuiļu novietnēs, aplokos un cūku atnešanās aizgaldos Staldren® jāizkaisa pa visām ejām. Ņemiet kārtīgu sauju (50-100g) produkta uz kvadrātmetru.

Atnešanās telpā/pieņemšanas novietnē Staldren® jāizkaisa pa visu grīdu pirms un pēc atnešanās, lai samazinātu infekciju rašanās iespējamību.

Tukšās novietnēs iespējams izkliegt Staldren® ar ventilatora palīdzību, tādējādi ļaujot Staldren® sastāvdaļām iznīdēt vīrusus.

JORENKU Staldren®



Staldren® mājputniem

Staldren® lietošana putnkopībā ir šāda:

Dējējvīsta: Staldren® tiek lietots gatavos būros, kuros tiks ievietoti jaunie cāļi. Plānā slānī izkaisiet apmēram vienu sauju (50-100g) produkta pa būri. Izkaisiet Staldren® pa visu grīdu (apm. 100g uz kvadrātmētru), kas atbilst vienam 25kg maisam uz 250 kvadrātmetriem grīdas virsmas. Centieties lietot Staldren® 1 reizi nedēļā perēšanas būros, kā arī pa visu grīdu, lai vienmēr nodrošinātu augstas kvalitātes apstākļus. Tādējādi tiks ierobežota baktēriju izplatība, amonjaks tiks nomākts un mitrums uzsūkts, un kāju un nagu slimību izplatība samazināta.

Kautuvēs: Uz 1500 kvadrātmētru platību jāizkaisa 75 kg Staldren® (50 g. uz kvadrātmētru) ar ventilatora vai izklieģētāja palīdzību. Pēc tam telpa jāizkaisa ar pakaišiem, kam pa virsu jāizkaisa 50 kg Staldren®. Pēc tam ievietojiet cāļus un visu telpu atkārtoti izkaisiet ar 50 kg Staldren® katru nedēļu līdz kaušanai. Mitrākā vidē, kā arī pie paaugstinātas baktēriju izplatības, Staldren® koncentrācijas līmenis ir jāappaaugstina. Arī tukšo vistu novietņu regulāra izsmidzināšana ar Staldren® labvēlīgi ietekmē vidi. Staldren® ir PH neitrāls, kas nozīmē nekaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī uz vistu kājām un nagiem.



JORENKU Staldren®



Staldren® zirgiem

Staldren® lietošana zirgkopībā ir šāda:

Ragvielas puves gadījumā Staldren® tiek izbārstīts tieši zirgiem zem kājām.

Kad stallis piemēslots, Staldren® jāizkaisa pa visu grīdu, apmēram 1-3 saujas (50-100g) uz kvadrātmētru, lai grīda izžūtu un samazinātos amonjaka smaka. Steliņgi jāizkaisa ar pakaišiem un to stūri ar Staldren®, lai mušu oļņas un kāpuri izžūst. Mitrās vietās un pēc pakaišu nomaiņas Staldren® jālieto šādi: 2-3 reizes nedēļā Staldren® jāizkaisa gar steliņa stūriem, lai nodrošinātu mušu oļņu un kāpuru izžūšanu.

Iztīrītos steliņgos Staldren® jāizkaisa pa visu grīdu, lai to dezinficētu, un pēc tam jāizklāj svaigi pakaiši. Beigās atkārtoti izkaisiet Staldren® pa visu grīdu, lai nodrošinātu pēc iespējas tīrāku vidi kumeļiem. Tas nodrošinās infekcijas slimību ierobežošanu gan ķēvēm, gan arī kumeļiem.



JORENKU Staldren®



Staldren® aitām un kazām

Staldren® lietošana aitu un kazu kopībā ir šāda:

Jēru aizgaldos: jēru aizgaldos Staldren® tiek izkaisīts apmēram 1-2 saujas (50-100g) uz kvadrātmtru pa visu grīdu tā, lai visa virsma tiktu noklāta. Pēc tam jāizkaisa pakaiši un atkal 1-2 saujas (50-100g) Staldren® uz kvadrātmtru, pārliedcinoties, ka visi stūri iz izkaisīti, lai novērstu mušu oliņu un kāpuru vairošanos. Staldren® jāizkaisa katras atnešanās laikā, lai jēriem nodrošinātu vislabāko dzīves sākumu.

Aizgaldos ar bieziem pakaišiem: Staldren® jāizkaisa pa visu grīdas virsmu apmēram viena kārtīga sauja (50-100g) uz kvadrātmtru. Staldren® tiek izkaisīts katrā kārtā. Staldren® ir pulverveida higiēniskis produkts, kas plaši iedarbojas pret mitrumu, smakām, baktērijām un sēnīšu sporām.



9. pielikums analīžu sertifikātam Test. nr. DKE 016078-06 un 0074-06

Metode:

4 g Staldren® tika iejaukti 5 ml fizioloģiskā nātrija hlorīda šķīdumā. Staldren® šķīdumā un kontroles šķīdumā bez Staldren® (9 ml fizioloģiskais NaCl šķīdums) katrā tika inokulēts 1ml baktēriju vai sēņu suspensija.

Šie maisījumi tikai turēti aerobos, anaerobos, mikroaerofilos apstākļos (atkarībā no baktēriju vai sēņu īpatnībām) istabas temperatūrā. Baktēriju daudzums tika mērīts pēc vienas stundas un divām diennaktīm.

Result	Staldren®		Kontrole bez Staldren®	
	1 stunda	2 dienas	1 stunda	2 dienas
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



LV/Staldren/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk