


Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green v práškové formě představuje hygienické řešení. Má dokumentovanou účinnost proti bakteriím a sporám hub, snižuje vlhkost a zápach.

- Staldren® Green může být použit v ekologickém zemědělství.
- Staldren® Green je Dánský výrobek, který byl důkladně testován uznávanými mezinárodními laboratorami pro použití jako širokospektrální hygienický prostředek.
- Staldren® Green je šetrný k životnímu prostředí, má ale dokumentovanou účinnost proti nejbežnějším druhům bakterií a fungicidním sporám (viz. příložená dokumentace na straně 7).
- Staldren® Green neobsahuje fosfáty a je pH neutrální. Nepoškozuje tak podlahy a kotce. Nevysušuje kůži zvířat, které jsou díky tenké pokožce citlivé na oděrky a škrábance, které usnadňují vstup infekce a vznik onemocnění. Při práci se Staldrenem® není zapotřebí nosit ochranné rukavice.
- Staldren® Green váže amoniak do té míry, že lidé ani zvířata nejsou obtěžováni těžkým zápachem a dýchacími potížemi.
- Staldren® Green snižuje vlhkost a je proto vhodný pro chovné stáje s vysokou vlhkostí.
- Staldren® Green dezinfikuje a čistí chovné prostředí, snižuje míru infekce a přispívá k lepšímu zdraví chovaných zvířat.
- Staldren® Green lze použít jak v domácím tak velkokapacitním chovu.

Je-li přípravek Staldren® Green používán souvisle, pak hygienická údržba stájí vykazuje nejlepší výsledky, snižuje se riziko infekce a jsou zajištěny podmínky pro zvířata i lidskou obsluhu.

Staldren® Green vykazuje minimální prašnost a je proto vhodný k posypu, přičemž zajišťuje příjemnou vůni na farmě.

Staldren® Green se dodává v 10, 15 kg nebo 25 kg pytlích, i na paletách s 10, 20, 40 nebo 66 pytlí.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green použití pro skot

Staldren® Green se v chovu dobytka používá následujícím způsobem:

Aplikuje se jedna plná hrst (50 – 100 g) přípravku Staldren® Green na m² dvakrát týdně. Tímto dojde v krátkém case k výraznému snížení choroboplodných zárodku. Při vysoké vlhkosti stájí nebo v případech, kdy došlo vypuknutí nemocí se Staldren® Green používá denne, než onemocnění opet ustoupí.

Ve vazné stáji se rozptyluje na zadní část lože, kde vlhkost podporuje rust různých bakterií a hub a tím zapříčinuje zánety vemene (Mastitis) a onemocnění paznechtu.

V boxech volného ustájení se Staldren® Green používá stejným způsobem, jako u vazného ustájení. Ve velkých ohrazeních, kde se krávy mohou otáčet, je nutné aplikovat Staldren® Green ve větším množství a na celou plochu.

Ve stájích s podestýlkou se Staldren® Green aplikuje 1x týdně, jedna velká hrst (50 – 100 g) na m².

Ve stájích určených pro otelení se Staldren® Green aplikuje na celou podlahovou plochu, tak abypodlaha byla zcela pokryta. Poté se připraví cerstvá podestýlka a následuje ještě finální dávka Staldrenu® Green. Tento cyklus se opakuje mezi každým otelením tak, aby nove narozená telata přicházela do co nejcistějšího prostředí a zvýšila se prevence proti infekčním onemocněním, které by mohly postihnout jak krávu, tak tele. Ve stáních pro telata se Staldren® Green používá 2 x týdně, plná hrst (50 – 100 g) na m². Pritom je důležité, aby byly dukladne ošetreny rohy u boku sten a okrajové linie, kde dochází k hromadení much. V případě prujmu se Staldren® Green aplikuje denne až do jejich ústupu.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green použití pro prasata

Staldren® Green se používá v odchovných prasat následujícím způsobem:

Na porodnách: Před oprášením se Staldren® Green rozptýlí v celém boxu. Rozhazuje se plná hrst na 1 m². Po oprášení se Staldren® Green používá 3 dny za sebou a poté 2x týdně až do odstavení. Posyp Staldrenu® Green se soustředí zvláště na místa za prasnicí a okolo plochy na ležení, aby celý prostor kolem byl suchý a selata neolizovala vlhká místa, kde se tvoří patogeny.



Stáj pro odstavení: Zde se Staldren® Green používá 3 dny po odstavu a poté 2 x týdně. Je nutné, aby jak plochy na ležení, tak vlhká místa v boxu byla pokryta a ošetřena.

Dokoncovací stáj: Staldren® Green se aplikuje 1 – 2 x týdně. To proto, aby se zlepšilo prostředí stáje a snížilo riziko infekce.

Veterinární péče: U nemocných prasat se používá Staldren® Green denne, aplikuje se na celou plochu podlahy.

Chovné stáje: V chovných boxech se rozsypává přípravek Staldren® Green v množství 50 – 100 g (plná hrst) na m².

Izolace: V boxech určených pro izolaci se Staldren® Green aplikuje na celou podlahovou plochu před a po přemístění zvířete, aby se eliminovalo riziko infekce.

Prázdné boxy: Používání Staldrenu® Green v prázdných boxech potlačuje vznik a rozšiřování patogenu. Je vhodné přípravek aplikovat pomocí automatického rozprašovace/dmychadla.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® použití pro drubež

Staldren® Green se v drubež používá následujícím způsobem:

Nosnic: Staldren® Green se používá v prázdných boxech, dříve než jsou přivedeny nové slepice. Rozptýlí se malé množství v každé kleci nebo boxu, přičemž platí, že 1 plná hrst odpovídá přibližně 50 až 100 g přípravku. Aplikace Staldrenu® Green se provádí na veškeré povrchové plochy (100 g na m²) nebo 1 x 25 kg pytel se rozsype na plochu o rozměrech 250 m². Staldren® Green se aplikuje jednou týdně a to jak v klecích, tak na celé podlahové ploše, aby se zajistily podmínky na nejvyšším stupni čistoty. Tímto se zamezí rozmnožování bakterií, je vázán amoniak, absorbována vlhkost a minimalizuje se riziko onemocnění a úrazu.



Jateční drubeže: Na každých 1500 m² plochy prázdné a čisté slepicí farmy připadá rozsypat 75 kg Staldrenu® Green (50 g na m²) za použití rozprašovacího systému. Jakmile je prostor zcela pokryt stelivem, přidává se navíc 50 kg Staldrenu® Green na jeho povrch. Další 50 kg Staldrenu® Green se aplikuje v momentě, kdy jsou do farmy přivedeny slepice a to v týdenních intervalech až do doby porážky. Při problémech s bakteriální infekcí nebo při vysoké vlhkosti se dávka Staldrenu® Green musí zvýšit. Při využití automatických rozprašovacích systémů se navíc zvyšuje ochrana proti virům. Staldren® Green je pH neutrální a působí tudíž příznivě na prostředí slepic a snesených vajec.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green použití pro kone

Staldren® Green se v chovu koní používá následujícím způsobem:

Staldren® Green vzhledem ke svému vysoušecímu a fungicidnímu účinku pomáhá redukovat případy pórovitých kopit a mouchivky. U mouchivky se Staldren® Green aplikuje přímo pod kopyta.

Po vykydání hnoje se aplikuje Staldren® Green na celou podlahu v množství 1 - 3 plných hrstí (1 hrst cca 50 – 100 g) na m². Při velké vlhkosti se používá cca 100 g na m². Dosáhne se tak suchého a cichove příjemného prostředí v boxu. Podlaha stáje se vyloží podestýlkou, podél jejíchž okraju se rozptýlí Staldren® Green, čímž dojde k vysušení larev a vajíček much. Poté se Staldren® Green používá ve vlhkém prostředí 2 - 3 x týdně. Zvláštní pozornost by se měla venovat tomu, aby Staldren® Green byl nasypán podél okraju stáje v rozích u sten (prevence proti rustu larev a vajíček much).

Ve stájích určených pro nove narozená hríbata se Staldren® Green aplikuje na celou podlahu, aby se zajistila její dezinfekce. Poté se připraví cerstvá podestýlka a aplikuje se finální dávka Staldrenu® Green po celé ploše tak, aby nove narozené hríbe pricházelo do co nejčistějšího prostředí. Tímto se zvyšuje prevence proti infekčním onemocněním, které postihují klisnu i hríbe.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green použití pro ovce a kozy

Staldren® Green se v chovu ovcí a koz používá následujícím způsobem:

Porodní boxy: Porodní box musí být důkladně vycištěn. Poté se aplikuje Staldren® Green po celé ploše podlahy (1 – 2 plné hrsti, 50 – 100 g na m²) tak, aby byla zcela zakryta. Následně se připraví podestýlka, na jejíž povrch se rozsype ještě pár plných hrstí přípravku. Zvláštní pozornost by se mělo venovat tomu, aby byl přípravek dobře rozmístěn podél stěn a rohu, kde se nejvíce líhnou larvy a vajíčka much. Staldren® Green se rozptýlí také mezi prčky, aby se nově narozenému mláďeti zajistily nejvyšší podmínky.

Chovné boxy: Plná hrst Staldrenu® Green (50 – 100 g na m²) se rozptýlí přes celou podlahu, následuje rozložení slámy/steliva a finální aplikace Staldrenu® Green na její povrch. Je-li přípravek Staldren® Green používán souvisle, pak hygienická údržba stájí vykazuje nejlepší výsledky, snižuje se riziko infekce a jsou zajištěny podmínky pro zvířata i lidskou obsluhu.



JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75

94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Príloha: Certifikát o analýze – Test c. DKE 016078-06 a 0074-06

Metoda:

4 gramy Staldrenu® Green se rozpustí v 5 ml fyziologického roztoku chloridu sodného. Roztok obsahující Staldren® Green a kontrolní vzorek bez Staldrenu® Green (9 ml fyziologického roztoku chloridu sodného) se naockují 1 ml suspenze obsahující bakterie a plísne. Smesi se kultivují aerobne/anaerobne/mikroaerofilne v závislosti na požadavcích na atmosférické podmínky. Kultivace probíhá při pokojové teplotě. Počet živých bakterií se určí po 1 hodině a po 2 dnech.

Výsledek	Staldren® Green		Kontrolní vzorek Staldren® Green	
	1 hodina	2 dny	1 hodina	2 dny
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



CZ/Staldren Green/BRO/0924

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk