


Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejti ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.

- A Staldren® Green biogazdálkodásban használható.
- A Staldren® Green elismert nemzetközi laboratóriumok által alaposan bevizsgált dán higiéniai termék, amelyet világszerte használnak.
- Staldren® Green kíméletes a környezethez, ráadásul kell mértékben bizonyított, hogy hatással van a leggyakoribb baktériumokra és gomba spórákra. (Kérjük, olvassa el dokumentációnkat a 7. oldalon).
- A Staldren® Green foszfátmentes és pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nem oldja fel/ és nem lazítja fel a padlózatot vagy állásokat, és ennél is fontosabb, hogy nem szárítja ki az állat vékony b rét, ami baktériumos fert zés vagy betegség táptalaját jelent horzsolásokat és vágásokat okozhat. Nincs szükség keszty viselésére a Staldren® Green termékkel végzett munka során.
- A Staldren® Green olyan mértékben köti meg az ammóniát, hogy mind az emberek, mind az állatok az er s szag és légzési nehézségek nélkül dolgozhatnak.
- A Staldren® Green felszívja a párákat és nedvességet, és ezért f leg magas páratartalmú állásokban használatos.
- A Staldren® Green fert lenfti és tisztftja az istálló környezetét, csökkenti a fert zöttséget, ezáltal pedig egészségesebbek lesznek az állatok.
- A Staldren® Green valamennyi háziállatnál használható, és a hivatásos állattenyészt k alapvet eszköze.

A Staldren® Green foknyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, mivel mindenkor csökkenti a fertözöttséget, és száltal megfelelő, kellemes szagú sertésólat érjet el, ami mind az állatok, mind az emberek számára kedvező.

A Staldren® Green csekény mérték porral jár, és könnyen kiszórható, illetve kellemes szagot ad a tyúképületben.

A Staldren® Green termeket 10, 15 vagy 25 kg-os zsakokban szállftjuk, és 10, 20, 40 vagy 66 sakokban raklapokon.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green szarvarmarhák és borjúk számára

Az alábbiak szerint használja a Staldren® Green terméket szarvasmarhákhoz és borjúkhoz:

Hetente kétszer szórjon ki egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként. Ez nagyon gyorsan és hatékonyan csökkenti a fertőzést. Nagyon nedves feltételek vagy fertőzés kialakulása kezdetén a mennyiséget és gyakoriságot napi rendszerességre kell növelni.



Az állásokban a Staldren® Green terméket a box hátuljára kell szórni, ahol a nedvesség bizonyos baktériumok szaporodását okozhatja, és a gombák nagyszámban, rohamosan terjedhetnek, és többek között tüdőgyulladást illetve különböző patabetegségeket okozhatnak.

A box állásokban a fentiek szerint használja a Staldren® Green terméket, a széles boxokban azonban, ahol a tehenek meg tudnak fordulni, több termék használatára lehet szükség. Az egész boxot kezelni kell.

Száraz almos/szalma almos állásokban/boxokban hetente egyszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) Staldren® Green terméket m²-enként.

A megtisztított ellet boxban szórja körbe a padlóterületet a Staldren® Green termékkel az egész box fertőtlenítése érdekében. Ettől kezdve tiszta és friss almot használjon, végül pedig ismét szórjon ki Staldren® Green terméket a teljes terület kezelésére. Ezt minden elletés között el kell végezni, hogy az újszülött borjú a lehet legtisztább környezetbe kerüljön. Ezzel megelőzi a fertőző betegségek kialakulását is lehet segítség mind a tehén, mind a borjú esetében. A borjú boxban hetente kétszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) Staldren® Green terméket m²-enként. Ügyeljen arra, hogy a boxok sarkait/széleit kezelje, mert ott telepednek meg rendszerint a legyek. Hasmenés esetén naponta használja a Staldren® terméket, amíg a betegség meg nem szűnik.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green sertések számára

Amikor a Staldren® Green terméket sertésekhez használja fel, az alábbiakat javasoljuk:

Ellet ben: Elletés el tt a Staldren® Green termékkel az egész sertésólat be kell szórni. Használjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként. Elletés után 3 egymást követ napon használja a Staldren® Green terméket. Ezután elválasztásig hetente kétszer használja. A hatás fokozása érdekében használja a Staldren® Green terméket a koca mögött, a fekhely körül és a malacok részében, illetve a sertésól egyéb nedves területein. Ezeken a helyeken szaporodnak a baktériumok. Ne feledje kezelni a pihen területet, valamint a nedves területeket a sertésólban.



A válogató ólban használja 3 egymást követ napon a Staldren® Green terméket, majd hetente kétszer.

A vágó sertésólban használja hetente egyszer vagy kétszer a Staldren® Green terméket. Ezzel jobb környezetet biztosít, és jelent sen csökkenti a fert zöttséget.

A beteg állat ólban naponta használja a Staldren® Green terméket a teljes padlóterületen.

A fedez vagy vemhes koca ól minden részére szórja e a Staldren® Green terméket. Használjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként.

A feladó/átvev területeken használja a Staldren® Green terméket a teljes padlózaton, az állatok feladása/érkezése el tt és után egyaránt a fert zésveszély csökkentése érdekében.

Az üres istállókban a Staldren® Green fúvó berendezéssel el nyösen szórható ki, mivel a Staldren® Green komponensei nagyon jó hatással vannak a vírusokra.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green baromfik számára

Staldren® Green tojótyúkok számára, amelyet az alábbi módon kell használni:

Tojótyúk: A Staldren® Green terméket a fészekrakó boxban kell használni, mielőtt az új tyúkok a kifutóra kerülnek. Szórjon egy kevés, kb. 1 maroknyi (50-100 g) mennyiséget mindegyik fészekrakó boxba. Szórja a Staldren® Green terméket az összes felületre (kb. 100 g m²), ez 1 x 25kg zsákot jelent 250 m² padlóterületenként. Hetente Egyszer használja a Staldren® Green terméket a fészekrakó boxokban, valamint a teljes padlóterületen, hogy a körülmények mindig a lehet legmagasabb szinten biztosíthatók legyenek. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok kiirthatók, az ammónium megköthető, a nedvességtartalom pedig felszívható, így minimálisra csökken a tojások sérülése.



Vágóépületben: Egy 1500 m² üres és tiszta csirkeólbán szórjon szét 75 kg Staldren® Green (50 g/m²) terméket fúvó berendezéssel vagy szórógéppel. Ha a terület "mélyalom" borítja teljesen, akkor 50 kg. Staldren® Green terméket kell ennek a tetejére rakni. Ezután kell a csirkéket az épületbe vinni, és 50 kg Staldren® Green terméket kell kiszórni szórógéppel hetente egyszer a tyúkok levágásáig. Nagyon nedves környezet vagy bacterium problémák esetében a Staldren® Green mennyiségét növelni kell. Ha fúvó berendezést használ üres csirkeépületben, akkor a Staldren® Green a vírusok ellen is jó hatású. A Staldren® Green pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nagyon kíméletes a környezethez, mind a tyúkok lába, mind a tojásrakás szempontjából.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green lovak számára

A lovak esetében a Staldren® Green termék az alábbiak szerint használatos.

Száritó és gombaöl hatásával a Staldren® Green segít a porózus pata betegségek és a patairha gyulladás csökkentésében. A patairha gyulladást közvetlenül a paták alatti kell a Staldren® Green termékkel kezelni.

Az istálló kitakarítása után a Staldren® Green terméket a padlózat teljes területére rá kell szórni, kb. 1-3 tele marokkal (50-100 g) m²-enként, hogy a padlófelület kiszáradjon, az ammóniaszag pedig minimálisra csökkenjen. Az almot a lóboxba kell tenni, és a Staldren® Green terméket úgy kell a szélek mentén kiszórni, hogy a légyteték és lárvák kiszáradjanak. A Staldren® Green terméket ezután a nedves helyeken kell használni, illetve ott, ahol az almot hetente 2-3 alkalommal cserélik, a Staldren® Green terméket a box széle mentén kell kiszórni a petékre és légylárvákra kifejtett szárító hatás fenntartása érdekében.

A kitakarított csikóboxokban a Staldren® Green terméket a teljes padlózatra kell kiszórni a box fertőtlenítése érdekében, utána pedig tiszta és friss almot kell lerakni. Végezetül a Staldren® Green terméket újra ki kell szórni a teljes területre, hogy az új csikó a lehet legtisztább környezetben legyen. Ezzel megakadályozhatók a fertőző betegségek mind a kanca, mind a csikó esetében.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green juhok és kecskék számára

Staldren® Green a juhok és kecskék esetében az alábbiak szerint használatos:

Az ellet boxban: Az ellet boxot alaposan ki kell takarítani, a Staldren® Green terméket a teljes padlóterületre ki kell szórni 1-2 maroknyi (50-100 g) mennyiségben m^2 -enként, hogy a teljes padlófelületet borítsa a Staldren® Green. Ezután a padlót szalmával kell fedni, és Staldren® terméket kell ismét kiszórni 1-2 maroknyi mennyiségben. (50-100 g)/ m^2 . Ügyeljen arra, hogy a por minden sarokba és élbe bekerüljön, hogy a légypeték és lárvák kiszáradjanak. A Staldren® Green terméket úgy kell kiszórni a lécek között, hogy az újszülött bárány a lehet legjobb létfeltételek közé kerüljön.

Mélyalmos akolban: Szórjon ki Staldren® Green terméket egy jó maroknyi (50-100 g) mennyiségben a teljes padlófelületre a szalmaalom lerakása előtt. Staldren® Green terméket kell a rétegek tetejére szórni. A Staldren® Green fokymatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, mivel mindenkor csökkenti a fertőzöttséget, és száltal megfelelő, kellemes szagú sertésólat érjet el, ami mind az állatok, mind az emberek számára kedvező.



JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75

94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

9. melléklet a DKE 016078-06 és 0074-06 vizsgálatszámú elemzési tanúsítványhoz

Modszer.:

4 g Staldren® Green kell 1 ml fiziológiai nátrium-klorid oldatban feloldani. A Staldren® Green oldat és egy Staldren® Green nélküli kontrollanyag (9 ml fiziológiai sóoldat) lett beoltva minden egyes 1 ml baktérium vagy gomba szuszpenzióba. A keverékeket aerob/anaerob/mikroaerofil feltételek alatt kell tartani a környezeti igényektől függően. Az oldatot szobahőmérsékleten kell tartani. A baktérium mennyiséget 1 óra és 2 nap után kell megállapítani.

Eredmény	Staldren® Green		Kontrollanyag Staldren® Green nélkül	
	1 óra	2 nap	1 óra	2 nap
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
Campylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



HU/Staldren Green/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk