


Staldren®



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren®



Staldren® on pulbriline hiigiainevahend, millel on väga efektiivne moju niiskuse, lohna, bakterite ja seenepooride vastu.

- Staldren® on Taani poolt valmistatud produkt, mis on iira testitud internatsionaalselt tunnustatud laboratooriumite poolt.
- Staldren® on tundlik ja mitte kahjulik oma umbruskonnale ja vahendil on väga hastidokumenteeritud efekt ki:iige tihiti tulevatele bakterite ja seenepooride vastu. (Vaata tabelist dokumentatsiooni lk 7)
- Staldren® on fosfaadivaba, ja ph-neutraalne ning vahend ei kahjusta lautade porandaide ja laudainventaari. Mis on veel tahtsam, vahend ei kuivata loomade orna nahka, nii et ei ole vaja karta, et loomade nahk rebeneb, mis põhjustab loomadele haavu, kust on bakteritel võimalik tungida loom ja põhjustada infektsioone ja haigusid. Vahendi kasutusel ei ole vaja kasutada l<indaid.
- Staldren® seob ammoniaaki, nii et inimestel ja loomadel ei põhjusta vahend lohnatundlikust ja hingamisprobleeme.
- Staldren® absorbeerib niiskust, ning sobib selleparast väga hasti lautadele kus on korge ohuniiskus.
- Staldren® desinfiseerib ja puhastab laudamilji:iid ning vahendab nakkust ja kindlustab selleparast tervislikkumaid loomi.
- Staldren® csobib koigile loomadele ja on selleparast väga vajalik professionaalsele laudale.

Staldren® i kasutamisega saavutatakse kõige paremad resultaadid, kuna nakkuseid kogu aeg vähendatakse, je see resulterib et on võimalik saada hästi lõhnavat laudamiljööd, mis on nii loomade kui ka inimeste rõõmuks.

Staldren® tolmutab minimaalselt, vahend on kerge purustada ja annab hea lõhna loomapidamishoone.

Staldren® on 10, 15 ja 25 kilostes kottides, ja 10, 20, 40, 45, 50 või 66 kotiga alustel.

JORENKU Staldren®



Staldren® lehmad ja vasikad

Staldren® i kasutamine lehmadele ja vasikatele on jargmine:

Purusta hea peotäis (50-100g) iga m² kohta 2 korda nädalas.

Tulemus on nakkuste vältimise kohta on väga kiire. Kui laut on väga niiske ja haiguseid on palju, tuleb kasutada rohkem Staldren® i, praktiliselt iga päev.

Kettilautades pannakse Staldren® i lehma tagumisele poolele, kus niiskus annab osadele bakteritele head elu tingimused, mis võimaldab bakteritel uuesti sigida suurel arvul, see võib lehmadele anda nisadepõletikku ja ka kabjavigastusi.

Voodilautades kasutatakse Staldren® i, nagu kettilautades, aga suurtemates boksides, kus lehmadel on võimalik ennast pöörata, tuleb panna rohkem Staldreni (tervele boksile).

Põhulautades kasutatakse Staldren® i 1 kord nädalas, hea peotäis (50-100g) iga m² kohta.

Puhtasse sünniboksi purustatakse Staldren® i üle terve põranda, nii et põrand on ära desinfitseeritud. See järel pannakse puhast ja kuiva alusmaterjali ja viimaks Staldren® i üle terve areaali. Niimoodi tehakse iga sünnituse järgi, et vasikas sünniks nii puhtas miljöös kui võimalik. Tulemuseks on, et vältidakse infektsioonilisi haigusi, nii lehmadel kui ka vasikatel. Vasikateboksidele kasutatakse Staldren® i 2 korda nädalas, hea peotäis (50-100g) ühe m² kohta. Pane eriti vahendit sinna kus kärbsed siginevad. Kui tuleb kõhulahtisus loomadel, kasuta Staldren® i iga päev kuni haigus on üle läinud.



JORENKU Staldren®



Staldren® sigadele

Staldren® sigadele kasutatakse järgmiselt:

Tiine emis: Enne siinnitamist pannakse Staldren® i tervele seaboksile. Pane hea peotais (500-100 g) iihe m² kohta. Parast sUnnitust pannakse Staldren® i 3 paeva järjest. Parast seda 2 korda nädalas, kuni porsad on ara vi>orustatud emise juurest. Pane Staldren® i eriti emise selja juurde, sootmis bokside juurde ja vaike porsaste koopasse, ja teistesse margadesse kohtadesse emiseboksis. See on siin, kus bakterid elutsevad.



Vaike sigade ara votmise perioodil pannakse Staldren® i 3 paeva järjest, ja parst 2 korda nädalas. Pane eriti magamiskohtadele ja margadele aladele.

Tappasigadele pannakse Staldren® i 1-2 korda nädalas. See annab parema miljoo ja vahendab baktereid ja nakkusid sigadel.

Haigete sigade tallides, kasuta Staldren® i iga paev tervel porandal.

Kultide lautadel ja jooksuajalistele sigade lautadele pane Staldren® i tervele lauda porandale. Pane hea peotais (500-100 g) iga m² kohta.

Vastusvotmise ja araandmis kohtades pannakse Staldren® i Ule terve poranda enne araandmist ja enne vastuvotmist, et hoida lira nakkusid ja haigusid.

Tilhjades lautades võib kasutada Staldren® i puhuriga, kuna vahendil on hea efekt viiruste vastu.

JORENKU Staldren®



Staldren® kanad

Staldren® i kasutamine kanadele on järgmine:

Munakana: I pannakse pesadekastidesse enne kui uued kanad sisse pannakse. Purusta väike kord igasse pesakasti umbes üks peotäis (50-100g). Purusta Staldren® i tervele põrandale (umbes 100 g m² kohta), see vastab üks 25 kg kott 250 m² kohta. Proovi niimoodi, et te kasutate Staldren® i 1 kord nädalas pesakastides ja ka tervel põrandal, niimoodi et miljöö koguaeg oleks kõrge tasemel. Niimoodi, et bakterite kogus hoitaks väiksel arvul, ammoniakki piiratakse ja niiskus absorbeeritakse. Nõnda väldid kanade jagade vigastusi.



Tappakanademajades: Tühjas kanalas, mis on 1500 m² ja puhtaks tehtud, purustatakse 75 kg Staldren® i (50 g. iga m²) kohta, kas puhuriga või levitusmasinaga. Pealeseda pannakse alla alusmaterjal, alusmaterjali peale pannakse järjekordselt 50 kg Staldren® i. Järgmisena pannakse sisse kanad ja pärast seda purustatakse 50 kg Staldren® i levitusmasinaga 1 kord nädalas, kuni kanad viiakse tappamaija. Kui on kanalamiljöö niiske ja bakterite arv kasvab tõsta juurde Staldren® i kogust. Tühjades kanalates võib kasutada Staldren® i puhuriga, kuna vahendil on hea efekt viiruste vastu. Staldren® on ph-neutraalne, mis tähendab, et vahend on väga leebe ümbruskonna vastu. Siin eriti kanade jalgade ja munasarjade vastu.

JORENKU Staldren®



Staldren® hobused

Staldren® i kasutamine hobustele on järgmine:

Staldren® i kuivatuse ja seenehävitamise omadus väldib hobuste kabja probleeme. Kui hobuse kabjal on probleeme kasuta Staldren® i otseselt kabja all.

Kui hobuse tallist on sõnnik välja viidud ja puhtaks tehtud, purusta Staldren® i tervele põrandale umbes 1-3 peotäit (50-100 g) iga m² kohta, nii et põrand kuivab ära ja ammoniak lõhn väheneb. Alus material pannakse boksi ja Staldren® i purustatakse seinte äärde, nii et kärbsemunad ja kärbsseussid ära kuivavad. Staldren® i kasutatakse järgnevalt nendes märgades kohtades, kus alus material välja vahetatakse. 2-3 korda nädalas urustatakse Staldren® i seinte äärde, et vältida kärbestekkimist.

Puhtaks tehtud sünniboksi purustatakse Staldren® i üle terve põranda, nii et boks on täielikult desinfitseeritud, peale seda pannakse puhas alusmaterial. Lõpuks pannakse jälle Staldren® i tervele areaalile, nii et vast sündinud varsal oleks nii puhas miljöö kui võimalik. See väldib infektsioonihaigusi, nii varsal kui ka märal.



JORENKU Staldren®



Staldren® lambad ja kitsed

Staldren® i kasutamine lammastele ja kitsedele on järgmine:

Värvaboks: CVärvaboks tuleb kõigepealt teha puhtaks, Staldren® i pannakse tervele põrandale. 1-2 head peotäit (50-100) ühe m² kohta, niimoodi et terve areaal on Staldren® iga koos. Pealeseda pannakse põhku, ja Staldren® i pannakse veelkordselt 1-2 head peotäit (50-100 g) ühe m² kohta. Ole tähelepanelik, et vahend tuleb kõikidesse nurkadesse, nõnda et kärbsemunad ja kärbsseussid ära kuivavad. Staldren® i purustatakse iga uue sünni järgi nii, et talledel ja kitse poegadel on võimalik saada hea elu algus ja tingimused.

Sügavpõhutallid: purustatakse Staldren® i hea peotäiega (50-100 g) ühe m² kohta tervele põrandale, enne kui põhku alla pannakse. Staldren® i purustatakse igale uuele järgnevale põhu korrale. Staldren® i kasutamisega saavutatakse kõige paremad resultaadid, kuna nakkuseid kogu aeg vähendatakse, je see resulteerib et on võimalik saada hästi lõhnavat laudamiljööd, mis on nii loomade kui ka inimeste rõõmuks.



Dokumenteeritud analüüsicertifikaadi dokument nr. DKE 016078-06 ja DKE 007477-06

Meetod:

4 grammi Staldren® i lahustatakse 5 ml'ises fUsioloogilisis naatriumckoriidi lahustuses. Staldren® i lahus ja kontroll ilma Staldren® ita (9 ml fUsioloogiline soolaveesi) inokuleeritakse iga 1 ml bakteri ja seene suspensiooniga. Kogus hoitakse aeroobselt/anaeroobselt/mikroaerofilt oleneb sellest millised noudmised on atmosfäärile. Hoidmine toatemperatuuril. Bakterite kogus pannakse kirja pea le 1 tundi ja peale 2 oopäeva.

Resultaat/Tulemus:	Staldren®		Kontrol ilma Staldren®ita	
	1 tund	2 ööpäeva	1 tund	2 ööpäeva
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



ET/Staldren/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk