

Staldren®



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren®



Staldren® por formájú higiéniai termék, amely nagyon széles körben fejt ki hatását nedvesség, szagok, baktériumok és gomba spórák ellen.

- A Staldren® elismert nemzetközi laboratóriumok által alaposan bevizsgált dán higiéniai termék, amelyet világszerte használnak.
- Staldren® kíméletes a környezethez, ráadásul kell mértékben bizonyított, hogy hatással van a leggyakoribb baktériumokra és gomba spórákra. (Kérjük, olvassa el dokumentációnkat a 7. oldalon).
- A Staldren® foszfátmentes és pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nem oldja fel/és nem lazítja fel a padlózatot vagy állásokat, és ennél is fontosabb, hogy nem szárítja ki az állat vékony b. ré, ami baktériumos fert. és vagy betegség táptalaját jelent horzsolásokat és vágásokat okozhat. Nincs szükség keszty viselésére a Staldren® termékkel végzett munka során.
- A Staldren® olyan mértékben köti meg az ammóniát, hogy mind az emberek, mind az állatok az er. s szag és légzési nehézségek nélkül dolgozhatnak.
- A Staldren® felszívja a párákat és nedvességet, és ezért f. leg magas páratartalmú állásokban használatos.
- A Staldren® fert. lenfti és tisztftja az istálló környezetét, csökkenti a fert. zöttséget, ezáltal pedig egészségesebbek lesznek az állatok.
- A Staldren® valamennyi háziállatnál használható, és a hivatásos állattenyészt. k. alapvet. eszköze.

A Staldren® foknyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, mivel mindenkor csökkenti a fert. zöttséget, és sz. által megfelel. kellemes szagú sertésólat érjet el, ami mind az állatok, mind az emberek számára kedvez. .

A Staldren® csekény mérték porral jár, és könnyen kiszórható, illetve kellemes szagot ad a tyúképületben.

A Staldren® termeket 10, 15 vagy 25 kg-os zsakokban szállftjuk, és 10, 20, 40, 45, 50 vagy 66 sakokban raklapokon.

JORENKU Staldren®



Staldren® szarvarmarhák és borjúk számára

Az alábbiak szerint használja a Staldren® terméket szarvasmarhákhoz és borjúkhoz:

Hetente kétszer szórjon ki egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m^2 -enként. Ez nagyon gyorsan és hatékonyan csökkenti a fertőzést. Nagyon nedves feltételek vagy fertőzés kialakulása kezdetén a mennyiséget és gyakoriságot napi rendszerességre kell növelni.



Az állásokban a Staldren® terméket a box hátuljára kell szórni, ahol a nedvesség bizonyos baktériumok szaporodását okozhatja, és a gombák nagyszámban, rohamosan terjedhetnek, és többek között tüdőgyulladást illetve különböző patabetegségeket okozhatnak.

A box állásokban a fentiek szerint használja a Staldren® terméket, a széles boxokban azonban, ahol a tehenek meg tudnak fordulni, több termék használatára lehet szükség. Az egész boxot kezelni kell.

Száraz almos/szalma almos állásokban/boxokban hetente egyszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) Staldren® terméket m^2 -enként.

A megtisztított ellet boxban szórja körbe a padlóterületet a Staldren® termékkel az egész box fertőtlenítése érdekében. Ettől kezdve tiszta és friss almot használjon, végül pedig ismét szórjon ki Staldren® terméket a teljes terület kezelésére. Ezt minden elletés között el kell végezni, hogy az újszülött borjú a lehető legtisztább környezetbe kerüljön. Ezzel megelőzheti a fertőző betegségek kialakulásának lehetőségét mind a tehén, mind a borjú esetében. A borjú boxban hetente kétszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) Staldren® terméket m^2 -enként. Ügyeljen arra, hogy a boks sarkait/széleit kezelje, mert ott telepednek meg rendszerint a legyek. Hasmenés esetén naponta használja a Staldren® terméket, amíg a betegség meg nem szűnik.

JORENKU Staldren®



Staldren® sertések számára

Amikor a Staldren® terméket sertésekhez használja fel, az alábbiakat javasoljuk:

Ellet ben: Elletés előtt a Staldren® termékkel az egész sertésólat be kell szórni. Használjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként. Elletés után 3 egymást követő napon használja a Staldren® terméket. Ezután elválasztásig hetente kétszer használja. A hatás fokozása érdekében használja a Staldren® terméket a koca mögött, a fekhely körül és a malacok részében, illetve a sertésól egyéb nedves területein. Ezeken a helyeken szaporodnak a baktériumok. Ne feledje kezelni a pihen területet, valamint a nedves területeket a sertésólban.



A válogató ólban használja 3 egymást követő napon a Staldren® terméket, majd hetente kétszer.

A vágó sertésólban használja hetente egyszer vagy kétszer a Staldren® terméket. Ezzel jobb környezetet biztosít, és jelentősen csökkenti a fertőzöttséget.

A beteg állat ólban naponta használja a Staldren® terméket a teljes padlóterületen.

A fedez vagy vemhes koca ól minden részére szórja el a Staldren® terméket. Használjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket m²-enként.

A feladó/átvev területeken használja a Staldren® terméket a teljes padlózatán, az állatok feladása/érkezése előtt és után egyaránt a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

Az üres istállóban a Staldren® fúvó berendezéssel elnyösen szórható ki, mivel a Staldren® komponensei nagyon jó hatással vannak a vírusokra.

JORENKU Staldren®



Staldren® baromfik számára

Staldren® tojótyúkok számára, amelyet az alábbi módon kell használni:

Tojótyúk: A Staldren® terméket a fészekrakó boxban kell használni, mielőtt az új tyúkok a kifutóra kerülnek. Szórjon egy kevés, kb. 1 maroknyi (50-100 g) mennyiséget mindegyik fészekrakó boxba. Szórja a Staldren® terméket az összes felületre (kb. 100 g m²), ez 1 x 25kg zsákot jelent 250 m² padlóterületenként. Hetente Egyszer használja a Staldren® terméket a fészekrakó boxokban, valamint a teljes padlóterületen, hogy a körülmények mindig a lehet legmagasabb szinten biztosíthatók legyenek. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok kiirthatók, az ammónium megköthető, a nedvességtartalom pedig felszívható, így minimálisra csökken a tojások sérülése.

Vágóépületben: Egy 1500 m² üres és tiszta csirkeólbán szórjon szét 75 kg Staldren® (50 g/m²) terméket fúvó berendezéssel vagy szórógéppel. Ha a területet "mélyalom" borítja teljesen, akkor 50 kg. Staldren® terméket kell ennek a tetejére rakni. Ezután kell a csirkéket az épületbe vinni, és 50 kg Staldren® terméket kell kiszórni szórógéppel hetente egyszer a tyúkok levágásáig. Nagyon nedves környezet vagy baktérium problémák esetében a Staldren® mennyiségét növelni kell. Ha fúvó berendezést használ üres csirkeépületben, akkor a Staldren® a vírusok ellen is jó hatású. A Staldren® pH-semleges, ami azt jelenti, hogy nagyon kíméletes a környezethez, mind a tyúkok lába, mind a tojásrakás szempontjából.



JORENKU Staldren®



Staldren® lovak számára

A lovak esetében a Staldren® termék az alábbiak szerint használatos.

Száritó és gombaöl hatásával a Staldren® segít a porózus pata betegségek és a patairha gyulladás csökkentésében. A patairha gyulladást közvetlenül a paták alatti kell a Staldren® termékkel kezelni.

Az istálló kitakarítása után a Staldren® terméket a padlózat teljes területére rá kell szórni, kb. 1-3 tele marokkal (50-100 g) m²-enként, hogy a padlófelület kiszáradjon, az ammóniaszag pedig minimálisra csökkenjen. Az almot a lóboxba kell tenni, és a Staldren® terméket úgy kell a szélek mentén kiszórni, hogy a légyteték és lárvák kiszáradjanak. A Staldren® terméket ezután a nedves helyeken kell használni, illetve ott, ahol az almot hetente 2-3 alkalommal cserélik, a Staldren® terméket a box széle mentén kell kiszórni a petékre és légylárvákra kifejtett szárító hatás fenntartása érdekében.

A kitakarított csikóboxokban a Staldren® terméket a teljes padlózatra kell kiszórni a box fertőtlenítése érdekében, utána pedig tiszta és friss almot kell lerakni. Végezetül a Staldren® terméket újra ki kell szórni a teljes területre, hogy az új csikó a lehető legtisztább környezetben legyen. Ezzel megakadályozhatók a fertőző betegségek mind a kanca, mind a csikó esetében.



JORENKU Staldren®



Staldren® juhok és kecskék számára

Staldren® A juhok és kecskék esetében az alábbiak szerint használatos:

Az ellet boxban: Az ellet boxot alaposan ki kell takarítani, a Staldren® terméket a teljes padlóterületre ki kell szórni 1-2 maroknyi (50-100 g) mennyiségben m^2 -enként, hogy a teljes padlófelületet borítsa a Staldren®. Ezután a padlót szalmával kell fedni, és Staldren® terméket kell ismét kiszórni 1-2 maroknyi mennyiségben. (50-100 g)/ m^2 . Ügyeljen arra, hogy a por minden sarokba és élbe bekerüljön, hogy a légypeték és lárvák kiszáradjanak. A Staldren® terméket úgy kell kiszórni a lécek között, hogy az újszülött bárány a lehet legjobb létfeltételek közé kerüljön.

Mélyalmos akolban: Szórjon ki Staldren® terméket egy jó maroknyi (50-100 g) mennyiségben a teljes padlófelületre a szalmaalom lerakása előtt. Staldren® terméket kell a rétegek tetejére szórni. A Staldren® fokymatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, mivel mindenkor csökkenti a fertőzőtséget, és száltal megfelelő, kellemes szagú sertésólat érjet el, ami mind az állatok, mind az emberek számára kedvező.



9. melléklet a DKE 016078-06 és 0074-06 vizsgálatszámú elemzési tanúsítványhoz

Modszerek:

4 g Staldren® kell 1 ml fiziológiai nátrium-klorid oldatban feloldani. A Staldren® oldat és egy Staldren® nélküli kontrollanyag (9 ml fiziológiai sóoldat) lett beoltva minden egyes 1 ml baktérium vagy gomba szuszpenzióba. A keverékeket aerob/anaerob/mikroaerofil feltételek alatt kell tartani a környezeti igényektől függően. Az oldatot szobahőmérsékleten kell tartani. A baktérium mennyiséget 1 óra és 2 nap után kell megállapítani.

Eredmény	Staldren®		Kontrollanyag Staldren® nélkül	
	1 óra	2 nap	1 óra	2 nap
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
Campylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



HU/Staldren/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk