

Staldren®



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren®



有效乾式消毒 品

Staldren® 是丹麥 品, 通過國際認證實驗室試驗做為衛生消毒 品, 廣為全球使用。

Staldren® 對環境是無害的, 尤其重要有文件證明對抗細菌和真菌芽 的良好效果。
(請參考補充資料)

Staldren® 是不含 ■ 而且pH ■ 為中性的, 不會腐蝕地板或畜欄, 也不至於讓動物皮膚太過乾燥至容易擦傷或割裂, 而造成細菌性感染。操作Staldren® ■ 不需戴手套。

Staldren® 吸附阿摩尼亞臭味, 使畜舍 活動的人員和動物得以舒服地呼吸。

Staldren® 吸附濕氣和水分, 特別在高濕度的畜欄格外好用。

Staldren® 消毒畜舍環境, 減少感染因此確保動物更為健康。

Staldren® 適用於所有種類的飼養動物, 對於專業畜牧生 產是 ■ 對的必須品。

Staldren® 不傷害人體, 也不傷害動物。

使用 明 :

Staldren® 平方公尺面積施撒手抓3把的量 (約150克), 畜牧場 週使用兩次足 ■ 維持良好健康環境。

在非常潮濕的 況或嚴重感染的情形時, 建議增加施撒 Staldren® ■ 次數。

如有詢問請聯絡我們。我們可以提供經驗予以協助。

Staldren® 有10公斤、有15公斤、25公斤袋裝包裝

JORENKU Staldren®



Staldren® 是粉劑的衛生消毒品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽。

用於牛的建議如下：

週兩次施撒 Staldren® 平方公尺面積手抓3把的量 (約150克)。如此能快速有效減少感染。在很潮濕的情況或疾病暴發時應增加用量並天天施撒。

各欄施撒 Staldren® 尤其在後▪附近地方，潮濕會引起一些細菌和真菌的滋生並快速大量增殖，導致乳房發炎及不同的足蹄問題。

在開放式牛舍，除非室▪有自由進出欄的設施，否則有必要在全區地板上施撒 Staldren®，並加強使用頻率。

在有覆蓋乾草▪料的牛床設施的牛舍，週一次施撒 Staldren® 平方公尺面積手抓3把的量 (約150克)。

在▪犢欄，先將▪料清除後再施撒 Staldren® 覆蓋全區整個地板。然後鋪上乾淨新鮮▪料，最後再施撒 Staldren®。次▪犢都應重複相同的用法，以確保犢牛出生在儘量乾淨的環境，並防止母牛和犢牛發生感染。

在犢牛欄，週兩次施撒 Staldren® 平方公尺面積手抓3把的量(約150克)，確定覆蓋全區的▪個角落和邊，因為這些地方通常引來蒼蠅聚集。如果有下痢發生，天天施撒 Staldren® 直到下痢消失。

持續使用 Staldren® 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少感染的發生，並為人和動物雙方的好處，創造無臭味的適宜環境。



JORENKU Staldren®



Staldren® 是粉劑的衛生消毒 品，廣效作用可除濕、 制臭、 殺滅細菌和真菌芽。

Staldren® 用於豬的建議如下：

分娩欄：分娩前施撒 Staldren® 平方公尺面積手抓3把的量（約150克）。分娩後繼續施撒 Staldren® 連續3天，然後 週兩次一直到離乳。在母豬後方和 臥區周圍（仔豬與母豬），及其他潮濕有細菌滋生的地方應該加強密集使用。

保育欄：自離乳施撒 Staldren® 連續 3天，然後 週兩次。欄 各區和潮濕之處應確實使用。

肉豬欄：週施撒 Staldren® 兩次，以減少感染的發生，創造更好的環境。

種豬欄：種母豬和種公豬欄 全區施撒 Staldren® 平方公尺面積手抓3把的量（約 150克）。

醫院：生病動物住院時整個地板上 天施撒 Staldren®。

隔離區：動物抵達或遷出前後全區地板上施撒 Staldren®，以降低感染的危險。

空欄：空欄 搭配使用吹風管施撒 Staldren®，以提供對抗病毒的良好效果。

持續使用Staldren® 藉此獲得良好的除濕、 制臭、 殺菌消毒效果，因而減少感染的發生，並且創造對人和動物更健康的環境。



JORENKU Staldren®



Staldren® 是粉劑的衛生消毒品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽。

Staldren® 用於蛋 的建議如下：

引進新母 前使用 Staldren®。在 箱中 平方公尺面積施撒手抓1把的量 (約50-100克)。
在所有表面上 平方公尺面積施撒Staldren® 100克的量，或 250平方公尺地
板覆蓋範圍施撒1袋25公斤 Staldren®。

在 箱及整個地板施撒 Staldren® 週一次，以確保飼養環境經常維持在最佳的條件，
意思是細菌被防治、阿摩尼亞臭味被壓制、水分被吸收，如此 隻 部獲得保護，
可能的傷害降至最低。

Staldren® 對沙門氏桿菌及彎曲桿菌的殺菌效果非常好。(參考補充文件)

Staldren® 用於肉 的建議如下：

在1500平方公尺乾淨的空舍，利用吹風管施撒75公斤 Staldren® (平方公尺面積50克)。
然後鋪 料後，在 料上再施撒50公斤 Staldren®，之後才讓 隻進入，在飼
養全期繼續 週一次施撒50 公斤 Staldren®。如果環境非常潮濕或有細菌問題時，
應增加Staldren® 用量。

如果在空舍中利用吹風管施撒 Staldren®，對抗病毒也有良好效果。

Staldren® 是pH 為中性的 品，對環境非常 和，而且不會損害 隻 部，也不會
對 蛋有不良影響。Staldren® 施撒後，迅速落下不塵揚，帶給 隻無臭味的舒適環境。

持續使用 Staldren® 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，
因而減少感染的 發生，並且創造對人和動物更健康的環境。



JORENKU Staldren®



Staldren® 是粉劑的衛生消毒品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽。

Staldren® 因具有乾燥及殺真菌的效果，所以有助於減少裂蹄及腐蹄病例。腐蹄病的處理可直接在蹄底施撒Staldren®。

Staldren® 用於馬的建議如下：

在馬廄打掃乾淨後，施撒 Staldren® 覆蓋整個地板，平方公尺面積手抓3把的量(約150克)，以確保地面乾燥及臭味降至最低。

然後，鋪上喜好材質的■料，接下來再沿著馬■邊施撒 Staldren®，如此能確使蒼蠅卵和幼蟲變乾。

之後，在潮濕的地方■料需要更換 週2-3次，馬■邊確實施撒 Staldren® 以維持對蒼蠅卵和幼蟲的乾燥效果。

在初生仔馬欄，施撒 Staldren®覆蓋整個地板以確實消毒，然後鋪上乾淨新鮮■料，最後再施撒 Staldren®，以確保仔馬出生在儘量乾淨的環境，並防止母馬和仔馬感染疾病。

持續使用 Staldren® 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少疾病的發生，並為人和動物雙方的好處，創造無臭味的適宜環境。



JORENKU Staldren®



Staldren® 是粉劑的衛生消毒品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽。

Staldren® 用於羊的建議如下：

羔欄：羔區確實清掃乾淨後，施撒 Staldren® 覆蓋全區整個地板，平方公尺面積手抓3把的量(約150克)。然後鋪上▯料，最後再施撒 Staldren®，確定有覆蓋到全區的各角落和邊，如此才能擔保蒼蠅卵和幼蟲變乾。

條板與條板間覆蓋著 Staldren®，初生羔羊因此得到生命中可能最好的起。

鋪▯料的羊舍：在鋪▯料前，施撒 Staldren® 覆蓋整個地板，平方公尺面積手抓3把的量(約150克)。鋪▯料後，在▯料上再施撒 Staldren®。

持續使用 Staldren® 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少感染的發生，並為人和動物雙方的好處，創造無臭味的適宜環境。



JORENKU Staldren®



Staldren® 是粉劑的衛生消毒品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽。使用 Staldren® 可以減少蒼蠅和跳蚤生長的條件。

Staldren® 用於貂的建議如下：

在生育期前準備箱時，一個籠子下方施撒 Staldren® (約50-100克)，以確保乾燥乾淨的環境。

如使用生育籠，在其支柱上及籠子下方施撒 Staldren®。

如必要先將生育籠 麥稈/木屑移出，然後使用 Staldren® 處理籠子，週1-3次在仔貂窩的潮濕處施撒 Staldren®，以確保乾燥和安全環境，使仔貂能較早吸住瓶的乳頭。

如果發生仔貂皮膚油膩的問題，天施撒 Staldren® 於仔貂身上、箱及母貂乳頭，直到問題結束。

當仔貂移出，之後定期施撒 Staldren® 以減少細菌和寄生蟲生長的條件。

細菌和寄生蟲常有可能在暖的窩生長，因此非常重要藉由持續使用 Staldren® 以預防細菌和寄生蟲滋生。而且，如此也能減少細菌和寄生蟲的大量侵襲，就整個農場來，能達到較高程度的健康態。



JORENKU Staldren®

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75

94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

附 9：制菌試驗 Test nr. DKE 016078-06 and 0074-06

試驗機構：Lantmannen Analycen MS

試驗編號 DKE 016078-06、DKE 0074-06

試驗成績摘要：

CFU:菌落數 mio:百萬

試驗菌株	Staldren®		對照組	
	1 小時	2 天	1 小時	2 天
大腸桿菌 O157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
黑黴菌 ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150,000 CFU/ml	500,000 CFU/ml
芽胞梭菌 ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1.9 mio CFU/ml
乳房鏈球菌 ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1.9 mio CFU/ml
鼠傷寒沙門氏菌 ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 mio CFU/ml	>1 mio CFU/ml
金黃色葡萄球菌 ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1.2 mio CFU/ml
豬鏈球菌 第 7 血清型	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	150,000 CFU/ml	6 mio CFU/ml
空腸彎曲桿菌 ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
克雷白氏肺炎菌	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4.2 mio CFU/ml	36 mio CFU/ml



JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk