

Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green jest środkiem higienicznym w postaci proszku, który ma bardzo szerokie działanie w zakresie pochłaniania wilgoci, likwiduje intensywny zapach pomieszczeń gospodarskich oraz zapobiega rozwojowi bakterii i zarodników grzybów

- Staldren® Green jest duńskim produktem, który został dokładnie przebadany przez uznane międzynarodowe laboratoria, jako produkt używany do higieny na całym świecie.
- Staldren® Green jest przyjazny dla środowiska, a ponadto posiada dobrze udokumentowane działanie na najczęściej występujące bakterie i zarodniki grzybów. (Proszę zapoznać się z naszą dokumentacją na stronie 7).
- Staldren® Green posiada neutralne pH i jest pozbawiony związków fosforanu, co oznacza, że nie koroduje / lub nie rozkrusza podłoża oraz nie reaguje z paszami. A co najważniejsze jego aplikacja nie wysusza skóry zwierzęcia. Wysuszona skóra jest bardziej podatna na otarcia i skaleczenia, które mogą następnie przekształcić się w stany bakteryjne i chorobowe. Nie ma potrzeby używać rękawic podczas pracy ze Staldrenem® Green.
- Staldren® Green wiąże się z amoniakiem do takiego stopnia, że ludzie i zwierzęta, mogą pracować bez konieczności wdychania intensywnego zapachu i nie mają trudności z oddychaniem.
- Staldren® Green absorbuje wilgoć i zanieczyszczenia, co jest szczególnie przydatne w obiektach o wysokiej wilgotności.
- Staldren® Green oczyszcza środowisko pomieszczeń gospodarskich, ogranicza podatność na infekcję a w związku z tym, zapewnia utrzymanie zwierząt w lepszym zdrowiu.
- Staldren® Green może być stosowany w obecności zwierząt i jest profesjonalnym narzędziem dla hodowców.

Ciągłe korzystania ze Staldrenu® Green pomaga zmniejszyć poziom infekcji, i uzyskać przyjemny zapach w chlewie, co korzystnie wpływa na zwierzęta i na ludzi.

Staldren® Green powoduje minimalne efekty pylenia, jest bardzo łatwy w użyciu a dzięki niemu uzyskujesz przyjemny zapach w kurniku.

Staldren® Green dostarczamy w workach 10, 15 lub 25 kg, jak również na paletach po 10, 20, 40 lub 66 workach.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green dla bydła i cieląt

Używaj Staldrenu® Green w obecności bydła i cieląt według następujących zasad:

Oprósz 1 m² powierzchni obory solidną garścią (50-100g) produktu 2 razy w tygodniu. Zadziała bardzo szybko i wydajnie zmniejszy obszar występowania infekcji. W bardzo wilgotnych warunkach lub na początku choroby, powinno się zwiększyć ilość produktu i stosować go codziennie.



W boksach Staldrenem® Green obsypuje się tył pomieszczenia, gdzie wilgoć zwiększa możliwość rozwoju niektórych bakterii i grzybów. Mogą się one namnażać w dużych ilościach oraz powodować zapalenie wymienia i stany zapalne racic.

W otwartych szopach: Na całej powierzchni obory używaj Staldrenu® Green jak wyżej, jednak w bardzo obszernych pomieszczeniach, gdzie krowy mają możliwość zmiany pozycji, może być konieczne zastosowanie większej ilości produktu. Należy zabezpieczyć całą powierzchnię.

W suchych, wyścielanych słomą oborach używaj Staldrenu® Green raz w tygodniu dobrą garść (50 - 100g) na 1m².

W oczyszczonym cielętniku rozsyp Staldren® Green na całej powierzchni pomieszczenia tak, aby cały cielętnik był odświeżony. Połóż na to świeżą ściółkę i na koniec dodaj ponownie Staldren® Green na całą powierzchnię. Powinno się to odbywać pomiędzy każdym wycieleniem, po to, aby cielę rodziło się w środowisku tak czystym jak to jest możliwe. Zapobiega to możliwości wystąpienia chorób zarówno u krowy jak i u cielęcia. W boksach dla cieląt używaj dobrą garść Staldrenu® Green (50-100g) na 1m² 2 razy w tygodniu. Upewnij się, że zostały oprószone narożniki / krawędzie boksu, miejsca gdzie najczęściej gromadzą się muchy. Jeśli wystąpi biegunka używaj Staldrenu® Green każdego dnia, aż ustaną dolegliwości.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green dla swin

Podczas hodowli świń zaleca się stosować Staldren® Green w następujący sposób:

W kojcu porodowym: przed porodem rozprowadź Staldren® Green na powierzchni całego chlewu. Użyj solidnej pełnej garści (50-100g) na 1 m². Po oprószeniu używaj Staldrenu® Green przez 3 dni z rzędu. Potem używaj 2 razy w tygodniu aż do odstawienia.

Skoncentruj się szczególnie rozsypując Staldren® Green za lochą, wokół żłobu, w narożniku dla prosiąt oraz w innych wilgotnych miejscach wewnątrz chlewu. Są to miejsca, gdzie najlepiej rozwijają się bakterie.

W tuczarniach używaj Staldren® Green kolejne 3 dni a następnie 2 razy w tygodniu. Pamiętaj, aby oprószyć obszary przeznaczone do odpoczynku zwierząt jak i wilgotne obszary w chlewie.

Tuczarniach świń: Stosując Staldren® Green w tuczarniach świń, posypuj ich powierzchnię raz lub dwa razy w tygodniu. Wpływa to na lepsze rezultaty i ma znaczący wpływ na redukcję poziomu infekcji.

Przy chorych zwierzętach używaj Staldrenu® Green codziennie na całej powierzchni chlewu.

Prośnych lochach: Podczas stosowania Staldrenu® Green przy knurach, maciorach w rui i prośnych lochach, oprósz Staldrenem® Green cały chlew. Użyj porządnej garści (50-100g) na 1m².

W pomieszczeniach służących do tymczasowego przetrzymywania zwierząt przed wysyłką/po przyjeździe użyj Staldrenu® Green na całej powierzchni, zarówno przed jak i po opuszczeniu / przybyciu zwierząt w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia.

W pustych pomieszczeniach gospodarskich Staldren® Green może być z powodzeniem stosowany w formie rozpraszania za pomocą rozsiewacza lub dmuchawy, ponieważ składniki Staldrenu® Green działają efektywnie na wirusy.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green dla drób

Staldren® Green dla kur niosek powinien być stosowany w następujący sposób:

Kur niosek: Staldren® Green jest stosowany w klatkach przed zagnieżdżeniem nowych kur. Rozsyp małą ilość, ok. 1 pełnej garści (50-100g), w każdym miejscu gniazdowania. Posyp Staldrenem® Green całą powierzchnię (ok 100g na 1m²). Ilość ta równa się 25 kg workowi Staldrenu® Green na 250 m²

powierzchni. Używaj Staldrenu® Green raz w tygodniu w klatkach jak i na całej powierzchni, w celu uzyskania warunków środowiskowych na najwyższym poziomie. Oznacza to, że rozwój bakterii jest pod kontrolą, amoniak i wilgoć zostały całkowicie wchłonięte a zakażenie karmą zminimalizowane.

Systemie klatkowym: Na 1500m² pustego i czystego kurnika rozsyp 75 kg Staldrenu® Green (50g na 1m²) za pomocą dmuchawy lub rozpylacza. Gdy powierzchnia jest całkowicie pokryta ściółką, rozsyp ponownie na jej powierzchni 50 kg Staldrenu® Green. Następnie umieść kury w kurniku. Rozpylaj 50 kg Staldrenu® Green za pomocą rozpylacza raz w tygodniu, aż do czasu uboju. W przypadku bardzo wilgotnego podłoża lub problemów z zakażeniem bakteryjnym, ilość Staldrenu® Green musi zostać zwiększona. Jeżeli do rozpylania Staldrenu® Green w kurniku używa się dmuchawy, wówczas wpływa on również korzystnie na ograniczanie infekcji wirusowych. Staldren® Green posiada neutralne pH, co oznacza, że jest bardzo przyjazny dla środowiska, dla nóg niosek oraz składanych jaj.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green dla koni

Staldren® Green w obecności koni stosuje się w następujący sposób:

Staldren® Green z jego wysuszającym i zapobiegającym rozwojowi zarodników grzybów działaniem, może przyczynić się do zmniejszenia przypadków porowatości kopyta i gnilca strzałki kopytowej. W przypadku wystąpienia gnilca strzałki kopytowej, Staldren® Green rozsypuje się zapobiegawczo bezpośrednio pod kopytami.



Po oczyszczeniu stajni oprósz Staldrenem® Green cały obszar podłogi 13-oma garściami (50-100g) na 1m², tak aby osuszyć powierzchnię podłogi i zminimalizować zapach amoniaku. Po położeniu świeżej ściółki w boksie posypuj Staldrenem® Green jego krawędzie w celu wysuszenia larw i jaj much. Następnie używaj Staldrenu® Green w wilgotnych miejscach i gdzie ściółka zmieniana jest 2-3 razy w tygodniu. Staldrenem® Green posypuje się krawędzie boksu w celu utrzymania efektu wysuszającego na jaja i larwy much.

W oczyszczonych porodówkach dla źrebiąt oprósz Staldrenem® Green całą podłogę w taki sposób, aby zabezpieczyć całą jej powierzchnię, potem połóż świeżą ściółkę. Wreszcie ponownie rozsyp Staldren® Green na całej powierzchni, tak, aby nowo narodzone źrebię przyszło na świat w możliwie najczystszy środowisku. Takie postępowanie pomaga zapobiegać występowaniu chorób zakaźnych zarówno u kłacz jak i u źrebięcia.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green dla owiec i kóz

Użyj Staldrenu® Green dla owiec i kóz w następujący sposób:

W boksie: Dokładnie oczyścić boks dla jagniąt i oprószyć 1 -2 garściami (50-100g) Staldrenu® Green 1m², tak aby cała powierzchnia została pokryta Staldrenem® Green. Następnie zrobić podściółkę ze słomy i ponownie posyp ją 1-2 garściami (50-100g) Staldrenu® Green na 1m². Upewnij się, że proszek jest rozłożony równomiernie w narożnikach i krawędziach bocznych boksu, co spowoduje wysuszenie jaj i larw much. Dzięki temu Staldren® Green jest tak rozprowadzony pomiędzy listwami, że nowonarodzone jagnię / koźlą dostaje najlepsze z możliwych miejsc narodzin.

W stajniach z głęboką podściółką: Rozprowadź porządną garść Staldrenu® Green (50-100g) na 1m² na powierzchni całej podłogi. Uprzednio rozłóż świeżą słomę. Staldren® Green powinien być rozprószony na powierzchni każdej ściółki. Najlepsze rezultaty osiąga się przy systematycznym stosowaniu Staldrenu® Green, ponieważ przyczynia się on do stopniowego zmniejszania ilości stanów chorobowych. Rezultatem jego stosowania jest mile pachnące środowisko w stajni, co pozytywnie wpływa na zwierzęta i na ludzi.



JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75

94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Załącznik nr 9 do świadectwa analizy testu nr. DKE 016078-06 i 0074-06

Metoda:

4 g Staldrenu® Green zostało dodane do 5 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu. Roztwór Staldrenu® Green i próba kontrolna bez Staldrenu® Green (9 ml. Soli fizjologicznej) zostały zarażone zawiesiną 1 ml. bakterii lub grzybów każda. Mieszanki były przechowywane z dostępem do tlenu / bez dostępu do tlenu / jako mikroaerofile w zależności od wymaganego ciśnienia atmosferycznego. Roztwory były utrzymywane w temperaturze pokojowej. Ilość bakterii została ustalana po upływie 1 godziny i 2 dni.

Wynik	Staldren® Green		Kontrola bez Staldren® Green	
	1 godziny	2 dni	1 godziny	2 dni
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



PL/Staldren Green/BRO/0424

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk