

Staldren®



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren®



Staldren® е хигиенен продукт под формата на пудра с широко приложение срещу влага, миризма, бактериални и гъбични спори.

- Staldren® е датски хигиенен продукт, обстойно тестван от известни международни лаборатории, който се използва в световен мащаб.
- Staldren® щади околната среда и най-вече има документиран ефект върху спорите на най-често срещаните бактерии и гъбички (вижте документацията на страница 7).
- Staldren® не съдържа фосфати и е PH-неутрален, което означава, че не взаимодейства неблагоприятно с настилките и повърхностите в боксовете и също така не изсушава кожата на животните. Сухата кожа е по-податлива на ожулвания и порязвания, което създава риск от инфекции и заболявания. При работа със Staldren® ръкавици не са необходими.
- Staldren® се свързва с амоняка по такъв начин, че неутрализира силната миризма и не предизвиква затруднения при дишане както при хората, така и при животните.
- Staldren® абсорбира влагата, което го прави особено подходящ за боксове с висока влажност на въздуха.
- Staldren® дезинфекцира и почиства средата в селсостопанските постройки, намалява броя на микробите и по този начин осигурява по-добро здравословно състояние на животните.
- Staldren® може да се използва с всякакви животни и е абсолютна необходимост за професионалния фермер.

При продължителна употреба на Staldren®, гарантираща най-добрите резултати, ще намалите нивата на инфекция и съответно ще постигнете по-добра среда както за животните, така и за хората.

Staldren® отделя минимално количество прах и е лесен за разпръскване, като същевременно осигурява приятна миризма в кокошарника.

Staldren® се предлага в разфасовки от 10, 15 и 25кг, както и на палети с 10, 20, 40, 45, 50 или 66 чувала.

JORENKU Staldren®



Staldren® За говеда и телета

Staldren® При употреба при говеда и телета се препоръчва следното:

Разпръсквайте по една шепа (50-100гр.) на кв.м два пъти седмично. Това ще осигури бърза и ефикасна защита от инфекции. При висока влажност или при епидемия честотата на употреба трябва да се увеличи до всекидневна.

В клетките, използвайте Staldren® по същия начин в задния край, където влагата може да предизвика увеличаване на броя на гъбичните и бактериални спори, за да предпазите вимето и копитата от евентуални инфекции и заболявания.

В отворени обори използвайте Staldren® по гореописания начин, освен ако кравите имат възможност да се движат или завъртат. Тогава трябва да използвате по-голямо количество от продукта и да третирате цялата площ.

В спални помещения, постлани със суха слама, разпръсквайте една шепа (50-100гр) на кв.м. веднъж седмично.

In the cleaned calving box: В родилните помещения, приложете Staldren® навсякъде върху вече почистеното пространство, след което постелете нова слама, последвана от нов слой Staldren®. Същата процедура трябва да се извършва след всяко раждане, за да може новороденото теле да се роди във възможно най-чиста среда. Така рискът от заболяване както за телето, така и за майката е значително по-малък. В клетките за телета прилагайте Staldren® 2 пъти седмично, по една шепа (50-100гр.) на всеки квадратен метър. Уверете се, че цялата площ, включително ъглите, е покрита, тъй като това е мястото, където обикновено се събират мухи. В случай на епидемия от диария, използвайте Staldren® всекидневно до приключването на епидемията.



JORENKU Staldren®



Staldren® За прасета

Staldren® При употреба при прасета се препоръчва следното:

При опрасване: Преди опрасването разпръснете Staldren® по цялата площ за опрасване. Използвайте 50-100гр на кв.м. След опрасване използвайте Staldren® в 3 последователни дни, след това два пъти седмично до отбиването.

Съсредоточете употребата на Staldren® в пространството зад майката-свиня и около пространството където майката-свиня и малките прасенца лежат, както и в пространствата с по-висока влажност, където бактериите биха се развивали по-бързо.

При отбиване: В помещенията за отбиване използвайте Staldren® 3 последователни дни, а след това 2 пъти седмично. Уверете се, че сте обработили пространството за почивка, както и влажните места в боксовете.

При угодяване: В помещенията за угодяване използвайте Staldren® един или два пъти седмично. Това ще осигури по-добра среда на живот и значително ще намали нивата на инфекция.

Помещения за болни животни: При болни животни използвайте Staldren® всекидневно върху цялата площ.

Изоляция: В пространствата за изолация използвайте Staldren® върху цялата площ както преди пристигането, така и след излизането на животните, за да намалите рискът от инфекции.

Празни боксове: Използването на Staldren® с разпръсквач в празните боксове оказва благоприятно влияние върху нивата на вируси.



JORENKU Staldren®



Staldren® За домашни птици

При употреба на Staldren® при носещи кокошки се препоръчва следното:

носачка: Staldren® се употребява в яслите за снасяне преди кокошките да бъдат пуснати вътре. Разпръснете малко количество във всяка ясла (приблизително една шепа или 50-100гр.) Разпръснете Staldren® по всички останали повърхности (100гр/кв.м) или 1 разфасовка от 25кг на площ от 250кв.м. Използвайте Staldren® веднъж седмично в яслите за снасяне и на останалата площ за да осигурите максимално добри условия за животните - бактериите са под контрол, амонякът е химически свързан и влагата е абсорбирана, така че рискът от нараняване на крката на животните е минимизиран.

птицекланницата: В празна и почистена птицекланница от 1500кв.м, разпръснете 75кг Staldren® (50гр/кв.м) с подходяща техника. Когато цялата площ е напълно покрита с дълбока постеля, разпръснете още 50кг Staldren® отгоре. След като птиците са пуснати вътре, разпръсквайте по 50кг веднъж седмично, докато животните се заколят. При високи нива на влага или при случаи на заболяване, увеличете дозата и честотата на използване. При използване на разпръсквач в празна птицекланница, Staldren® има благоприятен ефект и върху нивото на вируси. Staldren® е PH-неутрален продукт, което означава, че щати птиците.



JORENKU Staldren®



Staldren® За коне

При употреба на Staldren® с коне се препоръчва следното:

Staldren®, благодарение на изсушаващият и анти-гъбичен ефект, спомага за намаляването на случаите на възпаление на копитата. Възпалението на копита се третира като препаратът се прилага директно под копитото.

След почистване на конюшната приложете Staldren® по цялата площ, разпръсквайки между 1 и 3 шепи (от по 50-100гр) от препарата на кв.м, за да може повърхността да изсъхне и миризмата на амоняк да се притъпи. Покрийте площта на конюшната с предпочитаната от вас настилка и разпръснете Staldren® по ъглите, така че яйцата и ларвите на мухите да бъдат убити.

При употреба в помещения с новородени жребчета, разпръснете Staldren® по цялата повърхност, за да се уверите, че е дезинфекцирана, след което поставете свежа постеля. След това разпръснете отново от препарата, за да се уверите, че жребчето се намира във възможно най-чиста среда. По този начин предпазвате животните от зарази.



JORENKU Staldren®



Staldren® За овце и кози

При употреба на Staldren® при овце и кози се препоръчва следното:

В родилните отделения: Уверете се, че родилното отделение е добре почистено, разпръснете Staldren® върху цялата площ (1-2 шепи от по 50-100гр. на кв.м), така че цялата повърхност да е покрита. След това покрийте със слама или друга постеля и разпръснете още няколко шепи. Уверете се, че пудрата е разпръсната добре и по ъглите, така че да изсуши и убие яйцата и ларвите на мухите, които често се развиват на тези места. Staldren® се разпръсква между летвите, така че новороденото агне да получи най-добрият старт на живота си.

В обори с дълбока постеля: разпръснете Staldren® (50-100гр. на кв.м) върху цялата площ преди постелята да бъде постлана. Разпръснете Staldren® още веднъж, след това. При продължителна употреба на Staldren® постигате най-добрите резултати, тъй като рискът от заболяване намалява непрестанно. Това осигурява приятна атмосфера както за животните, така и за хората.



Приложение 9 към сертификат за анализ .Тест номер: DKE 016078-06 и 0074-06

Метод:

4гр Сталдрен се разтваря в 5мл разтвор натриев хлорид. Сместа със Сталдрен и контролна такава-без Сталдрен (9мл физиологична солена вода) се инжектират с 1мл бактериална или гъбична суспензия. Смесите се държат на стайна температура при различни нива на излагане на кислород, в зависимост от нуждите на бактериите. Броят на бактериите се проверява след 1 час и 2 дни.

Резултат	Със Staldren®		Контролна смес без Staldren®	
	1 час	2 дни	1 час	2 дни
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



BG/Staldren/BRO/0424

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk